



Preeclampsia ภาวะครรภ์เป็นพิษ

ภาวะครรภ์เป็นพิษเรียกอีกอย่างว่า ภาวะครรภ์เป็นพิษและความดันโลหิตสูงจากทำให้เกิดอาการบวม น้ำหนักขึ้นอย่างกะทันหัน และปัลสูตร้าเร็วๆ กับตัว มันอาจจะมีอาการประมาณสัปดาห์ที่ 20 ของการตั้งครรภ์และคงอยู่ไปจนการคลอดเกิด ภาวะครรภ์เป็นพิษมีผลประมาณ 6% ถึง 8% ของการตั้งครรภ์กั้งหมด พบได้บ่อยกับการคลอด自然 ภาวะครรภ์เป็นพิษนั้นร้ายแรง ภาวะที่ต้องรับรักษาเพื่อสามารถกล่าวเป็นปัลสูตร้าเร็วที่เรียกว่า eclampsia ภาวะ Eclampsia เป็นอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ขาดหัวใจได้ ในบางกรณีแม่หรือลูกอาจเสียชีวิตได้



สาเหตุ

ไม่ทราบสาเหตุ บางคุณเชื่อว่าปัลสูตร้าเร็วที่เกิดขึ้นอาจเป็นตัวกระตุ้น พูดอังกฤษว่าทำลังอุ่นลูกแพด เป็นโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรัง เบาหวาน โรคไต หรือโภชนาการที่ไม่ดีมีโอกาสได้รับมากขึ้น ดูเหมือนจะเกิดขึ้นในครอบครัว



อาการ

อาการคือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างกะทันหัน น้ำหนักขึ้นมากกว่าหนึ่งปอนด์ต่อสัปดาห์ และอาการบวมของมือ ใบหน้า และขา ภาวะครรภ์เป็นพิษรุนแรงทำให้อาหารเหล่านี้หายลง ร่วมกับอาการปวดท้อง ตาพร่ามัว และปวดศีรษะ ถ้ามี หากไม่ได้รับการรักษาและกล่าวเป็นภาวะ eclampsia อาการจะยังคงดำเนินอยู่ลงต่อไปอีก



วิธีจัดการ

ไม่มีการทดสอบเฉพาะสำหรับภาวะครรภ์เป็นพิษ แพทย์จะทำการวินิจฉัยจากการ เช่น ความดันเลือดเพิ่มขึ้นและน้ำหนัก



มากขึ้น ตรวจเลือดและปัสสาวะเสร็จแล้ว มีการตรวจหาโปรตีนซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะครรภ์เป็นพิเศษ สัญญาณสำคัญจะความดันโลหิตสูงและโปรตีนในปัสสาวะ

การรักษา

การรักษาขึ้นอยู่กับอายุของการกรกในครรภ์ และความรุนแรงของอาการ การรักษาที่บ้านก็เพียงพอสำหรับอาการที่ไม่รุนแรงนัดกิจกรรม



ประจำวัน พักผ่อนบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนะนำให้ตะแคงด้านข้าง ขึ้นบันไดบันบันบัน ฯ และการเก็บบันทึกน้ำหนัก ชุดตรวจโปรตีนในปัสสาวะ พูดถึงที่มีอาการรุนแรง จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล อาจจะกระตุ้นการเกิด อาจใช้ยาทางหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันการขั้ก การก่ออาเจต้องได้รับการคลอดก่อนกำหนดโดยการผ่าตัดคลอดหากอาการแย่ลงเรื่อยๆ หรือหากเกิดภาวะครรภ์เป็นพิเศษ ภาวะครรภ์เป็นพิเศษมักจะเริ่มหายไปหลังจาก 4 ถึง 6 ชั่วโมง หลังการเกิด พูดถึงส่วนใหญ่ไม่มีความดันโลหิตสูงหลังจากตั้งครรภ์

ควรไม่ควร

- ✓ พักผ่อนให้เพียงพอ
- ✓ นอบตะแคงด้านข้าง
- ✓ กินอาหารพิเศษตามแพทย์แนะนำ
- ✓ ตรวจปัสสาวะตามคำแนะนำ
- ✓ เจ็บไข้แพทายกร้าบหากมีอุ่นๆ หรือใบหน้าของคุณบวม หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงการมองเห็น ปวดศีรษะ หรือปวดบริเวณขา
- ✓ พบรักษาหากมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 ปอนด์ใน 24 ชั่วโมง



✗ ห้ามใช้ยาทุกชนิดในระหว่างตั้งครรภ์โดยไม่ต้องคำนึงแพทย์ก่อน