





Hypopituitarism ภาวะต่อมใต้สมองทำงานบกพร่อง

Hypopituitarism หรือ Underactive ต่อมใต้สมองเกิดขึ้นเมื่อต่อมใต้สมองพลิตหอร์โมนไม่เพียงพอ มันคือโรคของการแพทาย์ที่พบได้น้อย ต่อมใต้สมองซึ่งอยู่ใต้สมองคือ เรียกว่าต่อมหลัก เพราะช่วยควบคุมต่อมอื่น ๆ ที่พลิตหอร์โมนอักด้วย ต่อมอื่น ๆ เหล่านี้ได้แก่ ไตรอยด์ ต่อมหมวกไต และอวัยวะเพศ ความพิดปกติ น้ำอาจส่งผลกระทบต่อมอื่น ๆ จำบวนหนึ่งหรืออื่น ๆ ทั้งหมดที่มีซึ่งจากผลกระทบคือ เป็นค่ออยไปหรือกดกับหัว ต่อมใต้สมองคือ สำคัญต่อการควบคุมสมดุลของน้ำ ความดันโลหิต เพศสัมพันธ์ การตอบสนองต่อความเครียด และเมแทบอลิซึมพื้นฐาน ในภาวะต่อมใต้สมองทำงานบกพร่อง ฮอร์โมนเหล่านี้ไม่สามารถปล่อยออกมากได้




สาเหตุ

เหตุผลอย่างรวมถึงเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองหรือสมองส่วนอื่น ๆ เนื้องอก การติดเชื้อในสมอง เลือดออกในต่อมใต้สมอง การบาดเจ็บ ต่อมใต้สมอง การพั่ตัด โรคหลอดเลือดสมอง ความพิการแต่กำเนิด กรรมพันธุ์ที่หาได้ยาก การจยรังสีปัจจัยเบื้องหลังสมอง



อาการ

บางคนไม่มีอาการจนกว่าจะเกิดภาวะตึงเครียด เกิดขึ้น คนอื่นมีอาการที่เริ่มต้นอย่างกะทันหัน อาการต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว และความไวต่อแสงเพิ่มขึ้น ร่วมกับอาการคอแข็งอาการขึ้นอยู่กับระบบประสาทที่ได้รับผลกระทบ ต่อมไตรอยด์ที่ได้รับผลกระทบอาจทำให้คุณรู้สึกอ่อนแอกล้าและเหนื่อยล้า ท้องผูก ท้องอืด น้ำหนักขึ้น รังไข่ได้รับผลกระทบอาจทำให้รอบเดือนเปลี่ยนแปลง ซ่องคลอดแห้ง และการมีเพศสัมพันธ์ที่เจ็บปวด ลูกอัณฑะที่ได้รับผลกระทบอาจทำให้เกิดพลกระบกอาจทำให้เกิดปัญหาการ排尿ตัว ต่อมหมวกไตที่ได้รับผลกระทบอาจทำให้เกิด



อาการอ่อนแกรง วิงเวียนขณะยืน รู้สึกไม่สบายกัว และปวดกัว เด็กที่มีภาวะต่อเมื่อตั้งสมองพลิตน้อยลงทำให้เติบโตช้า



วิบัติ

แพทย์จะซักถามและทำการตรวจร่างกาย แพทย์จะนำตัวอย่างเลือดและปัสสาวะไปวัดระดับฮอร์โมน แพทย์ก็อาจสั่งจ่ายยาเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเหล่านี้หรือไม่ หลังกันยา การกดสอบภาษาพิเศษที่เรียกว่าการถ่ายภาษาพัฒนา คลื่นสมองแม่เหล็ก (MRI) อาจทำเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงของต่อเมื่อตั้งสมองหรือไม่



การรักษา

การรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุของภาวะต่อเมื่อตั้งสมองพลิตน้อย

แพทย์จะสั่งยาเพื่อกดแกนฮอร์โมนแต่ละชนิดร่างกายไม่สร้าง พุ่กที่มีภาวะต่อเมื่อตั้งสมองพลิต ฮอร์โมนน้อยจากต้องกันยาไปตลอดชีวิต รับประทานยาสามารถรักษาระดับฮอร์โมนอยู่ในเกณฑ์ปกติ วิถีเดียว อาจมีการผ่าตัดจำเป็นหากมีการเจริญเติบโตพิเศษในต่อเมื่อตั้งสมองหรือเนื้อเยื่อของสมองบริเวณใกล้เคียงทำให้เกิดภาวะต่อเมื่อตั้งสมองต่างๆ

ควรไม่ควร

- ✓ กินยาตามแพทย์สั่ง
- ✓ ควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าระดับฮอร์โมนอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ✓ ตรวจส่องไหแน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีใช้ยา.
- ✓ พกบัตรแจ้งเตือนการทำงานการแพทย์เพื่อแสดงภาวะต่อเมื่อตั้งสมองพลิตฮอร์โมนน้อย
- ✓ พบแพทย์หากมีไข้ คลื่นไส้ หรืออาเจียน หรือหากคุณรู้สึกอ่อนแกรงหรือวิงเวียน
- ✓ ควรสอบถามแพทย์เกี่ยวกับการซื้อยาจุกเจ็บที่บ้าน
- ✗ อาย่าหยุดกินยาโดยไม่บอกแพทย์ของคุณ
- ✗ อาย่าออกจากบ้านโดยไม่ได้รับการรักษาในกรณีฉุกเฉิน

