




ไม่สามารถตั้งครรภ์และมีลูกได้ 8% ถึง 18% ของคนในสหราชอาณาจักร โดยปกติ 80% ถึง 90% ของคู่ปกติจะตั้งครรภ์ในช่วง 1 ปีของการพยายามตั้งครรภ์ ภาวะมีบุตรยากมักหมายความว่าไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากพยายามมา 1 ปี ภาวะมีบุตรยากอาจแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอก และ ปัจจัยภายใน เป็นพื้นฐานในการเจริญพันธุ์ พัฒนาอยู่ที่ไม่เคยตั้งครรภ์อยู่ในกลุ่มปัจจัยภายนอก แต่ตั้งครรภ์มาแล้ว 1 ปี ก่อนอยู่ในกลุ่ม ปัจจัยภายใน มากกว่าครึ่งหนึ่งของพัฒนาอยู่ที่มีบุตรยากต่อไปในกลุ่มปัจจัยภายนอก และยากที่จะตั้งครรภ์หลังอายุ 30 ปี




### สาเหตุ

ประมาณ 35% ถึง 50% ของภาวะมีบุตรยากเกิดจากปัจจัยทางเพศชาย เช่น จำบวนสเปร์มต่ำ รูปร่างสเปร์มผิดปกติ หรือสเปร์มผิดปกติ การเคลื่อนไหวผิดปกติ ประมาณ 50% ถึง 60% ของภาวะมีบุตรยากเกี่ยวกับสภาวะของพัฒนาอยู่ ภาวะเหล่านี้รวมถึงโรคก่อ胚ไข่, ความผิดปกติของรังไข่ (การตกไข่) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเม็ดลูก หรือปากเมดลูก. สาเหตุของภาวะมีบุตรยากอีก 10% ถึง 20% ไม่ทราบสาเหตุ



### อาการ

อาการไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลังจาก 1 ปี หลังการมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีการคุณกำเบิด



### วิเคราะห์

การกดสอบเพื่อหาสาเหตุที่สำคัญ เช่น การนับจำนวนสเปร์ม ไปจนถึง การกดสอบที่ซับซ้อนมากขึ้น การกดสอบรวมถึงการตรวจเลือด



(เพื่อวัดฮอร์โมนเพศหญิง เช่น เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจน โปรเจสเทอโรน และฮอร์โมนกระตุ้นรูขุมขน) อัลตราซาวนด์ของมดลูกและรังไข่ หรือแม้แต่การส่องกล้อง การผ่าตัดดูที่อวัยวะสืบพันธุ์ ก่อนการกดสอบกีดีอีสิ่งจำเพาะคือต้องเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภาวะมีบุตรยาก รวมถึงวิธีการ ระยะเวลาที่ใช้ ข้อจำกัด และค่าใช้จ่าย

### การรักษา

การรักษาขึ้นอยู่กับการหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก และเพื่อให้สามารถตั้งครรภ์ได้ วิธีการทำเช่นนี้รวมถึง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต (เช่น การแพ้หรือการเพิ่มน้ำหนัก), ยา (สำหรับภาวะทางการแพทย์), ฮอร์โมน, และยาเช่น clomiphene citrate เพื่อให้รังไข่เริ่มทำงานปล่อยไข่ การผ่าตัด (เช่น การลดบล็อกก่อ胚นำไข่) และวิธีการอื่น ๆ เช่น การพสมเกี่ยมระหว่างมดลูกและในหลอดทดลอง



### ควรไม่ควร

- ✓ พุดคุยกับแพทย์ของคุณหากคุณกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อระหว่างการตั้งครรภ์
- ✓ มีเพศสัมพันธ์ต่อไปตามกำหนดการ.
- ✓ ทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายในปริมาณที่พอเหมาะ การออกกำลังกายมากเกินไปและการลดน้ำหนักอาจทำให้เกิดปัญหาการเจริญพันธุ์ โดยรบกวนการตกไข่ และประจำเดือน
- ✗ อายุรอบแฟ้ม: มากกว่า 35% ของคุณสมรสที่มีบุตรยาก
- ✗ อายุปล่อยให้กระบวนการพยาบาลตั้งครรภ์เข้ามาเป็นผลความสัมพันธ์ของคุณ
- ✗ อายุสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์หากคุณกำลังพยาบาลตั้งครรภ์

