



KAWASAKI DISEASE โรคคาซาซากิ

โรคคาซาซากิ (KD) เป็นภาวะที่พบได้ยากซึ่งทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือด (vasculitis) และอาการแสดงอื่น ๆ อีกหลายรายการที่ระบุไว้ด้านล่าง KD มักเกิดขึ้นในเด็กที่อายุน้อยกว่ามากกว่า 5 ปี พบบ่อยในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง ในสหรัฐอเมริกา มีการวินิจฉัยผู้ป่วยรายใหม่ 4,000 รายในแต่ละปี เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจในเด็ก



สาเหตุ

ไม่ทราบสาเหตุ แต่การติดเชื้ออาจทำให้เกิดการอักเสบ อย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่เป็นโรคติดต่อทางกรรมพันธุ์



อาการ

อาการต่าง ๆ ได้แก่ มีไข้มากกว่า 5 วัน และเป็นเกี่ยวข้องกับตาบวมแดง (เยื่อぶตาอักเสบ) ริมฝีปากแตก ลิ้นแดงสตรอเบอร์รี่ บวม เจ็บคอ ต่อม้ำเหลืองที่คอ บวม และมีผื่นขึ้นตามลำตัวและแขนขา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจหมายถึงการมีส่วนร่วมของหัวใจ ได้แก่ หายใจถี่ อาการเจ็บหน้าอก และอาการหัวใจล้มเหลว เช่น ขาบวม นอนราบบนเตียงไม่ได้ ตื่นมาอย่างกระสับกระส่าย และหายใจที่ขุ่นออกแรง



วินิจฉัย

แพทย์ทำการวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายและอาการ มีไข้มากกว่า 5 วันร่วมกับ 4 ใน 5 คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึงการพองตัวของคนพิวขาวของตา (เยื่อぶตาอักเสบ) และตาบวม เยื่อเมือกการเปลี่ยนแปลง (ลิ้นสีแดงและริมฝีปากแห้งแตก) มือบวมและเท้าบวม ต่อม้ำเหลืองคอ บวม และมีผื่นขึ้นตามร่างกาย แพทย์อาจส่งตรวจเลือดและเอ็กซเรย์ แต่ไม่เฉพาะเจาะจง การตรวจเลือดสามารถวินิจฉัย KD ได้ สำหรับสงสัยว่า



จะมีอาการหัวใจมาเกี่ยวข้อง การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการสวนหัวใจได้เสร็จแล้ว ใน การสวนสายสวน แพทย์จะสอดท่อเข้าที่ขา ใส่ผ่านหลอดเลือดแดงและเคลื่อนขึ้นสู่หลอดเลือดหัวใจ จากนั้นจึงฉีดสีย้อมเพื่อแสดงการอุดตันใน หลอดเลือดหัวใจ (หัวใจ)

การรักษา

แอสไพรินใช้สำหรับไข่ ผื่น ปวด และป้องกันลิ่มเลือด อุดตันในหลอดเลือดหัวใจ อิมมูโนโกลบูลินทางหลอดเลือดดำสามารถลดโรคหลอดเลือดหัวใจและปรับปรุง หัวใจเต้นแรงหากได้รับในช่วงต้น สำหรับหลอดเลือดหัวใจและหัวใจ แพทย์อาจแนะนำการ พ่นตัดหลอดเลือดหัวใจตีบ พ่นพิวหนิง ในขั้นตอนนี้ ปลายบอลลูนสอดท่อเข้าไปใน หลอดเลือดหัวใจ เพื่อเปิดหลอดเลือดแดงที่อุดตัน เด็กที่เป็นโรคหลอดเลือดมากมายน่า อาจ มีการพ่นตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ การปลูกถ่ายหัวใจ



ควรรู้

- ✓ อย่าลืมน้ำเกลือ 20% ของเด็กอาจมีปัญหาโรคหัวใจ
- ✓ เข้าใจปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจปัญหามีไข้มักเกิน 10 วัน อายุ น้อยกว่า 1 ปี และเพศชาย
- ✓ พบแพทย์เมื่อลูกมีไข้ มีผื่น หรือหายใจถี่
- ✓ พบแพทย์ของลูกคุณถ้าคุณเห็นต่อมน้ำเหลืองบวมในคอ
- ✓ พบกุมารแพทย์หากต้องการความช่วยเหลือ
- ✓ อย่าลืมน้ำโรคควาซาเกเป็นโรคหายากที่ต้องดูแลจากทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์กับภาวะ นี้



- ✗ อย่ากลัวที่จะขอความเห็นอื่น ๆ จากแพทย์
- ✗ อย่าละเลยอาการที่ปรากฏ