



## Herpangina เฮอร์ปังกีนา

เฮอร์ปังกีนา เป็นโรคไวรัสที่ทำให้เกิดแพลในกระเพาะและแพลพุพองภายในปาก ทำให้คough และปากกลایเป็นบวมแดง เป็นการติดเชื้อในวัยเด็กที่พบได้บ่อยในเด็กอายุ 1 ถึง 10 ปี อาจสับสนกับคออักเสบหรือโรคปากนกระจอก. มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง การฟันตัวใช้เวลาสองสามวัน ดึงหนึ่งสัปดาห์ จำเป็นต้องมีการรักษาเล็กน้อย



### สาเหตุ

สาเหตุคือไวรัสที่เรียกว่า coxsackievirus มันแพร่กระจายจากคนสู่คนโดยทางเดินหายใจหรือโดยการสัมผัสใกล้ชิด เช่นการจูบหรือกินอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ยังแพร่กระจายโดยการปนเปื้อนกับอุจจาระ เช่น เข้าห้องน้ำ ไม่ล้างมือแล้วจับอาหารเข้าปาก



### อาการ

อาการและอาการแสดงมักปรากฏภายใน 2 ถึง 9 วัน หลังจากได้รับไวรสร่วมกับอุณหภูมิ  $100^{\circ}\text{ F}$  ถึง  $104^{\circ}\text{ F}$  อาการเจ็บกระหายน้ำคือที่ทำให้กลืนลำบากมีจุดสีขาวอมเทา ร่วมกับขอบปากบวมแดง ปวดศีรษะ เบื้องอาหาร และอ่อนล้า เก้า มือ และกันสามารถมีแพลเหมือนในปากได้



### วินิจฉัย

แพทย์ทำการวินิจฉัยจากการขักประวัติทางการแพทย์และการตรวจร่างกาย การตรวจเลือดไม่ค่อยจำเป็นนัก



### การรักษา

ไม่จำเป็นต้องมีการรักษา

เฉพาะ การบริโภคของเหลวควรเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกัน

ภาวะขาดน้ำ จำเป็นต้องพักผ่อนจนกว่าไข้จะหายไป ยาที่ไม่ใช่แอสไพริน เช่น อะเซตามีโน芬 หรือ ไอบูโนเฟนสามารถใช้เป็นไข้และปวดได้ ฟองน้ำอาบน้ำอุ่นและใช้ลดไข้ได้ด้วยครัวหรืออาหารอ่อนหรือเหลวจนกว่าจะไม่มีอาการเจ็บคอ ไอศกรีมแท่ง ไอศกรีม เจลาติน และเกล็ดน้ำแข็งช่วยบรรเทาอาการปวดปากและคอ หลีกเลี่ยงน้ำผลไม้ที่เป็นกรดที่อาจทำให้ระคายคอ บางครั้งยาแก้ปวดเฉพาะที่ เช่น ลิโดเคบสามารถช่วยแก้อาการเจ็บคอหรือปากได้

### ควรไม่ควร

- ✓ ควรพักจนกว่าไข้จะหาย
- ✓ ใช้ยาไม่ใช่ยาแอสไพริน เช่น อะเซตามีโน芬 เพื่อรักษาอาการปวดและปัสสาวะ ไข้ฟองน้ำอุ่น ๆ เพื่อลดไข้
- ✓ ใช้ไอติมแท่งหรือน้ำแข็งก้อนเพื่อลดความรู้สึกไม่สบาย
- ✓ ล้างมืออย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค หลีกเลี่ยงการจูบและแบ่งปันอาหาร
- ✓ พบรแพกย์หากอาการไม่หายไปใน 1 สัปดาห์ หรือถ้าไข้สูงมากไม่ดีขึ้น
- ✓ พบรแพกย์หากไม่สามารถจี้ได้
- ✓ พบรแพกย์หากมีอาการขาดน้ำ เช่น พิษหนังแห้งแห้งเยื่อย่น; ปัสสาวะสีเข้ม หรืออื้นอยู่ลุก
- ✓ พบรแพกย์หากมีครีบในครอบครัวแสดงอาการของโรค



- ✖️อย่ากินอาหารร่วมหรือจูบใครจนกว่าจะมีการติดเชื้อหลังได้รับการรักษา
- ✖️ห้ามใช้แอสไพรินแก่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ( เพราะเสี่ยงต่อโรค Reye's )
- ✖️อย่าให้น้ำผลไม้ที่เป็นกรดซึ่งจะทำให้ระคายเคืองปากและคอ
- ✖️อย่ากินอาหารสเปิดก็จากทำให้ปากระคายเคือง