



# Eclampsia ครรภ์เป็นพิษระดับรุนแรงและมีภาวะชัก

ภาวะครรภ์เป็นพิษและภาวะครรภ์เป็นพิษเป็นภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ ภาวะครรภ์เป็นพิษเกี่ยวกับข้อความดันโลหิตสูง การสูญเสียโปรตีนในปัสสาวะ (ซึ่งหมายถึงความเสียหายของไต) และอาการบวมที่เท้าซึ่งเริ่มหลังจากสัปดาห์ที่ 20 ของการตั้งครรภ์ Eclampsia เรียกว่าภาวะครรภ์เป็นพิษหรือภาวะชักจากการตั้งครรภ์ มันเป็นอาการชัก หรืออาการโคม่าในผู้หญิงที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อยังไม่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ อาการชักไม่เกี่ยวกับความพิดปกติของสมอง ภาวะ Eclampsia มักเกิดขึ้นหลังจากตั้งครรภ์ได้ 20 สัปดาห์หรือ晚 น้อยกว่า 48 ชั่วโมงหลังคลอด Eclampsia ที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากเวลาเหล่านี้เรียกว่า atypical eclampsia ครรภ์เป็นพิษระดับรุนแรงและมีภาวะชัก ไม่ใช่เรื่องปกติ มันเกิดขึ้นใน 1 ใน 2,000 ถึง 3,000 การตั้งครรภ์ พบได้บ่อยในผู้หญิงที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ ในบรรดาผู้หญิงเหล่านี้ 2% ถึง 4% มีอาการชักเกิดขึ้น



## สาเหตุ

ไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน ความเสี่ยงที่สูงขึ้นเกี่ยวกับการมีการคลายคบหรือญาติสายตรง (พี่สาวหรือแม่) ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ เกิดขึ้น 3.6% ในผู้หญิงที่เป็นฟ้าแฟด ความดันโลหิตสูง ที่ไม่ได้ควบคุมหรือที่เป็นอยู่ก่อน เป็นโรคไต อายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นชาวแอฟริกัน-อเมริกัน เบาหวาน และการตั้งครรภ์ครั้งแรกเป็นความเสี่ยงอีก ๆ



## อาการ

อาการที่สำคัญคืออาการชัก อาการชักมักเริ่มต้นที่ใบหน้า กระตุกแล้วลุกลามเป็นอาการชักที่รุนแรง หลังจากการความจำเสื่อม ความบ้ำบ่ำ และความสับสนเกิดขึ้น อาการอื่น ๆ คือ การบวมน้ำ ด้วยการเพิ่มน้ำหนักกล้ามเนื้อยื่นรัดร็อก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะเรื้อรังที่หลังศีรษะ และอาการปวดท้อง.



## ວິນັດຈີຍ

ແພທຍົກກໍາການຊັກປະວັດຕືກແລະຕຽບຈຳຮ່າງກາຍ. ການຕຽບ  
ການຫ້ອງປັບປຸງການຂອງເລືອດແລະປັສສາວະຈະກຳເພື່ອຂັດ  
ຄວາມພິດປົກຕົກທີ່ຄລ້າຍຄລຶກກັນ ສໍາຫຼັບວາການປວດຫັວ  
ຈະຕ້ອງການ X-ray ຮວມດັ່ງການເວົກຊາຍເຄວມພິວເຕອນ (CT) ມີການດ້ານ  
ສະນາມແມ່່ເໜັກ (MRI) ຂອງສນອງເພື່ອຄວບຄຸມສາເຫຼຸອນໆ ທ່ານວາການປວດຫັວ



## ການຮັກເຫຼາ

ເນື່ອງຈາກວັນຕາຍກາວຮ້າຍແຮງວາຈານດົງແນ່ງແລະກາຣກ  
eclampsia ມັກຈະໄດ້ຮັບການຈັດການໂດຍກົມແພທຍົກ ສູຕົບຮີ  
ແພທຍົກແລະແພທຍົກເວົາກາງທີ່ຢັກກັບເດືອກເກີດແລະກົມ  
ດູແລພູ້ປ່ວຍເຫັນກີ່ສາມາຊັກຄນສໍາຄັລູຂອງກົມ ການຮັກເຫຼາ  
ຈະເກີດຂຶ້ນໃນໂຮງພຍາບາລ ໃນການຮັກເຫຼາຊັກຈາກກາວະຄຽດກໍ  
ເປັນພື້ນ ແມ່ນຕ້ອງວາກາຄນກໍ່ໃຫ້ວັດຊາຈຸບເລືອດຄົງກໍ່ ຕ້ອງຮັກເຫຼາຄວາມດັບແລະຄວາມພິດປົກຕົກໃນ  
ຫ້ອງປັບປຸງການຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແນກນີ້ເຊີຍມໃຫ້ສໍາຫຼັບການຊັກ ການໃຫ້ສາຮັບນ້ຳແລະຍາກາງ  
ຮລວດເລືອດດຳເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມາຮັດາແລະລູກນ້ອຍໄດ້ສາຮັບນ້ຳເພີ່ມພວແລະຄວບຄຸມຄວາມດັບໂລຮັດໃຫ້  
ຄົງກໍ່ຈຳກວ່າຈະຄລອດ ຈະມີການຕຽບສອບວັດທະຍາການຕັ້ງຂອງກາຣກ ສູຕົບຮີແພທຍົກຈະ  
ຕັດສັບໃຈເຮັງຈາກຕຽບຈຳຮ່າງກາຍແນ່ງແລະເດືອກເນື່ອພຣ້ອມຄລອດ



## ຄວຣິນໍ້ຄວຣ

- ✓ ອຍ່າລື່ມວ່າກາວະຄຽດກໍເປັນພື້ນໂຮຄຮ້າຍແຮງ ວັດທະຍາການເສີຍຊົວຕາຂອງພູ້ອຸດຸງກໍມີກາວະ  
eclampsia ເວລື່ຍ 5%
- ✓ ຄວຣເຂົ້າຮັບການຮັກເຫຼາພຍາບາລຕັ້ງແຕ່ເປັນ ທ່ານ ແລະສນູ້ເສນອ ເພື່ອໃຫ້ມີການວິນັດຈີຍແລະຮັກເຫຼາກາວະ  
ເຂັ້ນ preeclampsia ກາວະຄຽດກໍເປັນພື້ນຈາປ້ວງກັບຊັກຮະຫວ່າງຕັ້ງຄຽດກີດ



- ✗ ອຍ່າເພີດເຈຍຕ່ວງວາການ ພບແພທຍົກກໍາການຂອງຄຸລຸນີ້ມີດັ່ງກ່າວແຮງແຍ່ງລົງດ້ວຍ
- ✗ ມີການໃຫ້ຢາໃດ ທ່ານ (ຮວນດັ່ງຢາທີ່ຂ້ອງເວົງແລະພລິຕັກລົງທີ່ສຸມຸນີໄຟຣ) ໂດຍໄມ້ສອບການ  
ແພທຍົກກ່ອນ
- ✗ ມີການສູບບຸຫຮ່ວມໃຫ້ພລິຕັກລົງທີ່ຢາສູບໃດ ທ່ານ