

โรคติดเชื้อลิสเทอเรีย คือการติดเชื้อร้ายแรงที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ป่นเปื้อนแบบก็อเรย์ แบบก็อเรย์เหล้าบีบได้บ่อยที่สุดในเนื้อไม่สุกและพลิตกัณฑ์จากนม โรคติดเชื้อลิสเทอเรีย เป็นโรคร้ายแรงระบบสาธารณสุขแต่เป็นการติดเชื้อที่ไม่ธรรมดា ทุกคนสามารถติดเชื้อได้ แต่ผู้ใหญ่และเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยป่วยหนัก อย่างไรก็ตามบางคน เช่น 込んだที่สตรีมีครรภ์และการยกในครรภ์มีความเสี่ยงสูง โรคติดเชื้อลิสเทอเรีย ทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด การแท้งบุตร หรือการตายคลอด การยกแรกเกิดสามารถป่วยหนักได้หากติดเชื้อก่อนคลอด ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอกลางกับ มีความเสี่ยงสูง บุคคลเหล่าบีบรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่นมะเร็งหรือเอดส์ ผู้ป่วยด้วยอวัยวะ และผู้สูงอายุ



สาเหตุ

สาเหตุมาจากการรับประทานอาหารที่ป่นเปื้อนเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อ Listeria monocytogenes Listeria พบได้ในดินและน้ำ และสามารถเข้าสู่พิษตับได้จากดินหรือจากปุ๋ย. Listeria ยังสามารถเข้าไปในเนื้อดินและนมและอาหารแปรรูป (เช่น เดลี่ชีส เนื้อยี่นัน และหอกดีโวก)



อาการ

บางคนมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัด โดยมีอาการ เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน ก้อนร่วง และปวดแสงกระเพาะอาหาร หากแบคทีเรียเข้าสู่ระบบประสาท อาจมีอาการเย่ลง. ปวดศีรษะ คอเคล็ดซัก สูญเสียการทรงตัว และรับความรู้สึก สับสนหรือสับสนจากเกิดขึ้นได้



วินิจฉัย

แพทย์ทำการตรวจร่างกายและใช้ประวัติทางการแพทย์ การทดสอบที่ทำเพื่อการวินิจฉัยอาจรวมถึงการแพะเชื้อจากเลือดและไขสันหลังหากมี



การติดเชื้อของเยื่องหุ้มรอบ ฯ สมองและไขสันหลัง (เยื่องหุ้มสมองอักเสบ) จะถูกกัด การแพะเชื้อเลือดเกี่ยวกับการนำเลือดจากหลอดเลือดดำและส่งไปยังห้องปฐมติการเพื่อศึกษาเพื่อดูว่ามีแบคทีเรียในเลือดหรือไม่ การจะกระดูกสันหลังเกี่ยวกับการเวลาตัวอย่างของเหลวจากไขสันหลังออกมาน้ำเล็กน้อยและส่งไปตรวจทางห้องปฐมติการการปรากรถตัวของแบคทีเรีย Listeria

การรักษา

การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ คนมากจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาล. จากนั้นสามารถให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ วันนี้เป็นวันที่เร็วและมากที่สุด การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะมักใช้เวลา 2 สัปดาห์ คบก็มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแวงอาจต้องได้รับการรักษานานขึ้น เป็นจากโรคภัยไข้เจ็บมากจะกลับมา



ควรไม่ควร

- ✓ แจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาทั้งหมดของคุณ (รวมถึงยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์และผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
- ✓ แจ้งแพทย์ หากคุณยังมีอาการหลังจากการหายาปฏิชีวนะเสร็จ
- ✓ ปรุงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมดรวมทั้งไข่เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก.
- ✓ ล้างผักและผลไม้ทุกชนิดก่อนรับประทาน
- ✓ ล้างมือและอุปกรณ์การทำอาหารด้วยสบู่ร้อน น้ำหลังจากจับต้องอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสัมผัสกับของดิบและเนื้อสำเร็จรูป



- ✗ อาย่าหยุดการยาปฏิชีวนะเอง
- ✗ อาย่าดื่มน้ำที่ไม่ผ่านการน้ำเชื้อ มีบมพาสเจอร์ไอส์ ถูกความร้อนเพื่อนำเข้าแบคทีเรีย