





Vaginal Cancer มะเร็งช่องคลอด

มะเร็งหมายถึงการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย. มะเร็งช่องคลอด หมายถึง การเติบโตของเซลล์มะเร็งในช่องคลอด ช่องคลอดเป็นก่อ เชื่อมระหว่างมดลูกกับวัยวะเพศออกด้านข้าง มะเร็งชนิดนี้มักเกิดขึ้นในเซลล์เยื่อบุช่องคลอดมะเร็ง ก่าหายากนี้ส่งผลกระทบต่อพัฒนา 1 ต่อ 200,000 คน เป็นหลัก เกิดขึ้นหลังวัยหมดประจำเดือน [การเปลี่ยนแปลงของชีวิต] อายุเฉลี่ย คือ 60 ปี มะเร็งสามารถแพร่กระจายไปยังบริเวณใกล้เคียงอย่างหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทางกระเพาะเลือดหรือระบบปัสสาวะ



สาเหตุ

ไม่ทราบสาเหตุ พัฒนาอยู่ที่มารดาภินยาที่เรียกว่า DES (diethylstilbestrol) ในระหว่างตั้งครรภ์เสี่ยงที่จะเป็นได้และอายุยังน้อย สิ่งใดเป็นเหตุการอักเสบของช่องคลอดในระยะยาวอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งนี้ ซึ่งรวมถึงการใช้ pessary มากเกินไป การถ่ายภาพรังสีอุ้งเชิงกราน การติดเชื้อไวรัสเอชพีวีแบบแพปพิลโลมา (HPV) และ ประวัติครอบครัวที่เป็นมะเร็งของวัยวะสืบพันธุ์จากเพิ่มความเสี่ยง



อาการ

อาการทั่วไป ได้แก่ เลือดออกที่ไม่เกี่ยวข้องกับรอบเดือนหรือรอบเดือนผิดปกติ ปวดบริเวณอุ้งเชิงกราน ปวดเวลาปัสสาวะ และปวดหรือมีเลือดออกระหว่างมenses ท้องผูกและก้อนในช่องคลอดยังสามารถเกิดขึ้นได้



วินิจฉัย


แพทย์วินิจฉัยจากการและจะทำการตรวจอุ้งเชิงกรานเพื่อดูการอักเสบ แพล ก้อน หรือเนื้องอก การตรวจแปปสเมียร์ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการขุดช่องคลอด



และปากมดลูกเป้า ๆ เพื่อเก็บเซลล์ สิ่งเหล่านี้จะถูกตรวจนับด้วยกล้องจุลทรรศน์ การทดสอบอื่น ๆ อาจรวมถึงการตรวจขันเนื้อ การเอกซเรย์ทรวงอก และการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ของกระดูกเชิงกรานและช่องท้อง การตรวจขันเนื้อจากการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อขบวนเด็กเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์

การรักษา

มีการใช้การผ่าตัด เค้ม้ำบัด และการฉายแสง การรักษาแบบใดหรือแบบพสมพسانขึ้นอยู่กับสถานที่และระดับความรุนแรงยังไงและอายุ และสภาพร่างกายของผู้หญิง ยิ่งโรคแพร่กระจายมากเท่าไหร่การรักษาที่ยั่งนานขึ้นเท่านั้น ทีม



แพทย์อาจรวมถึงผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการรักษามะเร็ง (แพทย์ด้านเนื้องอกวิทยาและนักโลหิตวิทยา) เนื้องอกวิทยารังสี (ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้รังสีรักษาเพื่อเนื้องอกหดตัว) และศัลยแพทย์เนื้องอกวิทยา (ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้การผ่าตัดรักษามะเร็ง) การผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาที่พบบ่อยที่สุด มะเร็งขบวนเด็กอาจได้รับการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ลำแสงและแกะที่สามารถกำลังเนื้องอกได้ การรักษาด้วยการฉายรังสีจากไข้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการผ่าตัด ยาเคมีบำบัดสามารถใช้เพื่อนำเซลล์มะเร็งได้ มักให้ร่วมกับการผ่าตัดหรือการฉายแสง

ควรไม่ควร

- ✓ บัดหมาดกับผู้เชี่ยวชาญทุกครั้ง
- ✓ กำหนดอาหารที่ดีเพื่อช่วยให้มีความแข็งแกร่ง และรับมือกับผลข้างเคียงของการรักษา
- ✓ เรียนรู้เกี่ยวกับความเจ็บปวด คันหนาแพทย์ที่คิดว่าจะช่วยได้



✗ อย่าเพิกเฉยต่ออาการ พบแพทย์หากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจากการรักษา

✗ อย่าหยุดทานยาหรือเปลี่ยนขบวนยาแม้รู้สึกดีขึ้นเว้นแต่แพทย์จะบอก