




Shoulder Dislocation ข้อไหล่หลุด

ข้อต่อ คือ จุดที่กระดูกตัวแตร 2 ข้างขึ้นไปมารวมกัน ข้อไหล่เป็นข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มากที่สุดของร่างกาย เพราะว่ามีเส้นกล้ามเนื้อจำนวนมากที่สุดที่จะหลุดออก การหลุดเกิดขึ้นเมื่อยอดข้อ (ส่วนยอดบนของกระดูกตัวแตร) ถูกดึงออกจาก臼ข้อ หรือเคลื่อนหลุดมีสองประเภท แบบได้รับอุบัติเหตุกระแทกและไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุซึ่งมักเกิดขึ้นในวัยรุ่นที่มีข้อต่อหลุว แบบอุบัติเหตุมักมาจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือการใช้ร่วมกับการใช้แรงงานมากเกินไป



สาเหตุ

อาการไหล่หลุดมักเกิดขึ้นกับคนในวัย 30 ปี เมื่อพากขาเล่นกีฬา มักเกิดกับผู้ใช้แรงงานที่ได้รับบาดเจ็บ. ผู้ที่มีอายุ 60 ถึง 80 ปีโดยทั่วไปไหล่หลุดเมื่อหลัง ผู้ที่มีอาการไหล่หลุดระหว่างการซัก เนื่องจากความกระด้างของกระดูกตัวแตร



อาการ

หัวไหล่ที่ได้รับผลกระทบดูเคลื่อนหรือพิดกับ臼ฟกช้ำ หรือสีเปลี่ยน จับไหล่หรือแขนในท่าคงที่ขยับข้อไหล่ไม่ได้ มีอาการชา อ่อนแรง และปวดไหล่. ความเจ็บปวดนี้อาจให้ลงแขนและเข้าสู่มือ

วินิจฉัย

แพทย์จะทำการวินิจฉัยจากประวัติทางการแพทย์และการตรวจร่างกาย คุณจะถูกดูดามคำตามเกี่ยวกับเหตุการณ์นำไปสู่การบาดเจ็บ หรือใช้งานแขนมากเกินไป แพทย์จะทำการตรวจร่างกายและสั่งอีกช雷ย์ กะเพอส์บี การกดสอบ เช่นการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI)



การรักษา

แพทย์อาจยับข้อให้กลับเข้ากี แขนอาจใช้สลิงหรือเฝือกเพื่อลดการเคลื่อนไหวของข้อ แพทย์อาจสั่งยาสำหรับอาการปวดและการอักเสบ แพทย์อาจแนะนำให้พบนักกายภาพบำบัด บุคลากรทาง



การแพทย์สามารถสอนวิธีลดความเสี่ยงของข้อให้หลังติด นักบำบัดอาจสอนการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของข้อให้หลัง อาจได้รับการดูแลจากพี่ช่วยชาญอีก เช่น แพทย์ศัลยกรรมกระดูก ศัลยแพทย์ช่วยชาญในการรักษาข้อและกระดูก อาจจำเป็นต้องทำการผ่าตัดหากข้อให้หลังอ่อนแองและเคลื่อนตัวได้ยากขึ้น

ควรไม่ควร

- ✓ ควรบอกแพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่คุณใช้ รวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ซื้อจากเคาน์เตอร์
- ✓ ออกกำลังกายตามที่แพทย์ นักกายภาพบำบัด หรืออื่น ๆ ตามคำแนะนำ
- ✓ ควรกลับไปพบแพทย์เพื่อติดตามผล
- ✓ สวนชุดและอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเล่นกีฬา
- ✓ พบรักษาหากอาการปวดให้หลังคงอยู่หลังจากการรักษา
- ✓ พบรักษาหากคุณมีอาการแขนหักหรือมืออ่อนแรง



✗ อย่ากำจัดธรรมที่ต้องใช้แรงมากหรือยกของหนักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์

