





Cervical Incompetence ปากมดลูกหลวม

Cervical incompetence คือ การอ่อนตัวหรือเปิดพิสดรตัวของปากมดลูกในช่วงต้นของการตั้งครรภ์ ปากมดลูกคือช่องทางเข้ามาดูดลูก ปากมดลูกหลวมมักจะนำไปสู่การขยายช่องปากมดลูกกังหันเหดในช่วงไตรมาสที่สอง เยื่อบุมดลูกที่ยึดการกินครรภ์ไว้ (ถุงน้ำ) อาจแตกได้ และการก่อจุลคลอตอนก่อนกำหนด มากถึง 2% ของกังหันเหดการตั้งครรภ์อาจได้รับผลกระทบ กาวะน้ำอาจทำให้เกิด 20% ถึง 25% ของการสูญเสียการตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองกังหันเหด



สาเหตุ

กาวะกีที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดความอ่อนแอง แต่บ่อยครั้งกีไม่ทราบสาเหตุ ปัจจัยที่เพิ่มโอกาสในการมีปากมดลูกหย่อนรวมถึงการบาดเจ็บที่ปากมดลูก (เช่น การขยายและการขุดมดลูกหรือที่เรียกว่า D&C) และมีปากมดหย่อนก่อนหน้านี้ กับการตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้ อีกทั้งฮอร์โมน การผ่าตัด (เช่น การตัดขั้นเนื้อ “โคง”) การสัมผัสถก DES (diethylstilbestrol) และความพิสดรตัวของมดลูกหรือปากมดลูก (เช่นปากมดลูกสั้น) อาจมีผลได้



อาการ

โดยปกติแล้วผู้หญิงที่มีความบกพร่องทางปากมดลูกจะมีอาการไม่มาก แพทย์สามารถวินิจฉัยได้เบื้องจากมีความสังสัยว่าเป็นโรคดังกล่าว



วินิจฉัย


แพทย์จะทำการตรวจทางช่องคลอดของปากมดลูกและทำการตรวจประวัติทางการแพทย์ การวัดที่กำ/doiy ใช้อัลตราซาวด์เพื่อยืนยันได้ สามารถใช้อัลตราซาวนด์



เพื่อกำกับดูแลสุขภาพอย่างดีกับความยาวและรูปร่างของปากมดลูก กับส่วนที่สำคัญส่วนใหญ่ของการรักษา

การรักษา

เมื่อแพทย์คิดว่าสามารถรักษาปากมดลูกไม่พร้อมเกิดขึ้นได้ แพทย์อาจต้องการตรวจร่างกายและอัลตราซาวนด์บ่อยกว่าปกติ หากตรวจพบปากมดลูกพิดปกติ ปากมดลูกอาจเย็บปิดด้วยไหมพิเศษ ขั้นตอน



การผ่าตัดเล็กนี้ทำที่ห้องตรวจพู้ป่วยนออก แพลเย็บบี้จะคงอยู่จนถึงประมาณ 38 สัปดาห์ ของการตั้งครรภ์ เมื่อเวลาออกด้วยวิธีร่วง่ายๆ ที่ห้องตรวจ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ ความเสี่ยงของการมีเลือดออก การหดตัว การแตกของเยื่อหรือการติดเชื้อ ฝีเย็บ ยังคงคาวิ้ช่วยลดความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดโดยสิ้นเชิง ขั้นตอนนี้จะทำได้ดีที่สุดระหว่าง 10 ถึง 14 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ โดยที่ไปไม่สามารถทำได้หลังจากผ่านไปประมาณ 24 สัปดาห์ แพทย์อาจแนะนำให้นอนพักบนเตียง

ควรไม่ควร

- ✓ แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับประวัติการคลอดก่อนกำหนดหรือการคลอดปกติ ช่วยบ่งบอกความไม่พร้อมของปากมดลูก
- ✓ แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับการมีเลือดออก การหดตัว หรือการไหลของน้ำคร่ำที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์



✗ อายุที่จะดำเนินแพทย์ว่าอาการของคุณหรือเมื่อไหร่ หรือการรักษาจะหมายความว่าคุณต้องมีการผ่าตัดคลอด และไม่สามารถคลอดบุตรได้ตามปกติ