



Impetigo แผลติดเชื้อแบคทีเรีย

แผลพุพองคือการติดเชื้อที่ผิวหนังที่ไม่รุนแรง เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการกและเด็ก แพร่กระจายได้ง่ายจากคนๆ เดียวไปสู่คนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพวกเขาอยู่ใกล้ชิดกัน พี่น้องที่เล่นกีฬาสัมผัส มักจะติดต่อกันได้



สาเหตุ

แบคทีเรียสองชนิดที่เรียกว่า Staphylococcus (staph) และ Streptococcus (strep) ทำให้เกิดแผลพุพองแยกกันหรือรวมกัน ปกติแบคทีเรียเหล่านี้จะอาศัยอยู่บนผิวหนัง แต่สามารถเข้าไปในชั้นบนสุดของผิวหนังและทำให้เกิดการติดเชื้อ แผลพุพองมีแนวโน้มเป็นมากขึ้นเมื่อผิวหนังได้รับบาดเจ็บ เช่น มีรอยขีดข่วน ถลอก หรือแมลงกัดต่อย เด็กเล็กสามารถกระจายได้ง่ายเพราะไม่ค่อยล้างมือ



วินิจฉัย

แพทย์จะวินิจฉัยจากรูปลักษณะของผิวหนัง แผลพุพอง อาจทำการทดสอบเพื่อค้นหาว่าแบคทีเรียชนิดใดทำให้เกิดการติดเชื้อ swab ใช้ในการเก็บตัวอย่างของเหลวภายในตุ่ม ตรวจเลือดหรือปัสสาวะในกรณีที่อาการรุนแรงเพื่อให้แน่ใจว่าแบคทีเรีย ไม่ได้ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน



การรักษา

แผลพุพองควรได้รับการรักษาโดยเร็วเพื่อไม่ให้มันแพร่กระจายใต้ผิวหนัง และป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่น โรคไต หากไม่ได้รับการรักษา แผลพุพองสามารถคงอยู่ได้นานหลายสัปดาห์ แผลพุพองตอบสนองต่อยาอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่หายไปภายใน 7 ถึง 10 วัน ยาปฏิชีวนะให้เป็นครีมทาบนผิวหนังหรือยาเม็ดจะฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เปลือกสีน้ำตาลที่แผลพุพองจะค่อยๆ หลุดออก แผลพุพองให้ชุบด้วยผ้าเปียกก่อน จากนั้นล้างด้วยสบู่ต้านเชื้อแบคทีเรีย



ควรไม่ควร

- ✓ ให้ลูกของคุณหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นแผลพุพอง
- ✓ ทาครีมยาปฏิชีวนะตามใบสั่งแพทย์ภายในจมูกเด็กช่วยป้องกันไม่ให้แผลพุพองกลับมา ถ้าลูกของคุณมีการติดเชื้อแผลพุพองบ่อย ๆ แบทก็เรียบบักฟังตัวด้านในจมูกและสามารถติดผ่านนิ้วได้
- ✓ ดูแลผิวให้สะอาดและป้องกันกาการติดเชื้อจากการล้างมือ ใช้สบู่ต้านเชื้อแบคทีเรีย.
- ✓ อาบน้ำให้ลูกอย่างน้อยวันละครั้ง
- ✓ ล้างแผล บาดแผล แผลงัดต่อย อย่างทั่วถึง
- ✓ เก็บของเล่นและสิ่งของอื่น ๆ ที่ลูกของคุณเล่นด้วยความสะอาด
- ✓ พบแพทย์หากลูกของคุณรู้สึกไม่สบายในขณะที่ทานยาปฏิชีวนะ
- ✓ เล็มเล็บของลูกน้อยเพื่อลดรอยขีดข่วน
- ✓ พบแพทย์หากลูกของคุณไม่ดีขึ้นใน 7 ถึง 10 วัน มีไข้ 101.5 F ขณะได้ยา สมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ ติดเชื้อหรือปัสสาวะของเด็กรมีเลือดปน



- ✗ อย่าปล่อยให้ลูกของคุณขูดหรือเกาตุ่มพอง
- ✗ อย่าปล่อยให้ลูกของคุณที่มีแผลพุพองสัมผัสใกล้ชิดกับคนอื่น.
- ✗ อย่าใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าปูเตียงร่วมกับผู้อื่น

