





แมลงสัตว์กัดต่อย ได้แก่ มด มด ชี้แมลงวัน และยุง แมลงกัด ได้แก่ พืช ต่อและแตน แมลงเหล่านี้มักจะสร้างความรำคาญแต่บางผู้คนอาจมีอาการแพ้ต่อการถูกกัดหรือต่อย บางแมลงเป็นพาหะนำโรคมายังสู่คน กลุ่มที่เรียกว่าสัตว์ขาปล้องซึ่งรวมถึงแมลงที่อยู่ในกลุ่มแมงด้วย-แมงมุม แมงป่อง เห็บ และไร แมงมุมที่มีพิษหลักในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ แมงมุมหางสีน้ำตาล แม่ม่ายดำ ทารินทูล่า และก๊วยซ่าย แมงมุมกัดส่วนใหญ่คือ รู้สึกไม่สบายแต่รักษาได้ไม่มีปัญหา



อาการ

อาการเจ็บปวดหรืออาการคันเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในระยะแรก จากนั้นจึงเกิดรอยแดงและบวม รอยกัดอาจติดเชื้อได้ เหล็กในทำให้เกิดอาการปวดและบวมเฉพาะที่ การถูกต่อยหลายๆ ครั้งอาจทำให้เกิดอาการบวม อ่อนแอ สับสน มีปัญหาได้ หายใจติดขัด เป็นลม อาเจียน และท้องร่วง ไตล้มเหลวภาวะหัวใจหยุดเต้นและอาจถึงแก่ชีวิตได้จากการแพ้



อย่างรุนแรง ความผิดปกติต่าง ๆ เช่น โรค Lyme มีแพร่กระจายโดยเห็บ และ โรคไข้สมองอักเสบแพร่กระจายโดยยุง แมงมุมสีน้ำตาลกัดอาจทำให้เกิดอาการแสบ แดง และ แผลพุพองบวมและเลือดคั่ง แผลพุพอง และการติดเชื้อ แมงมุมHoboกัดทำให้เกิดปัญหาคล้ายๆ กัน รวมทั้งปวดศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แมงมุมแม่ม่ายดำกัดมักจะทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง บางครั้งตามด้วยอาการระตุกของช่องท้อง บริเวณแขนขาและหลังมีความดันโลหิตสูง เหงื่อออก และ อาเจียน ทารินทูล่ากัดเหมือนตัวต่อต่อยด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรง แดงและบวม

วินิจฉัย

การวินิจฉัยขึ้นอยู่กับประวัติทางการแพทย์และการตรวจร่างกาย การตรวจเลือดจำเป็นสำหรับโรค Lyme หรือ โรคไข้รากสาดใหญ่ เท่านั้น หรือหากมีไข้ ออกผื่น ปวดศีรษะหรือปวดข้อ

การรักษา

ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการถูกกัดหรือต่อย สวมใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว และหมวก ตัดมุ้งลวดที่ประตูและหน้าต่าง สำหรับการกัดและต่อยส่วนใหญ่ ใช้น้ำแข็งหรือเย็น ยาสเตียรอยด์ครีมและยาแก้คัน แพ้และบวมได้ กินยาสเตียรอยด์ใช้รักษาปฏิกิริยารุนแรงหรือถูกกัดหรือต่อย หลายครั้ง ยาปฏิชีวนะจะได้รับสำหรับไข้ เช่น โรค Lyme ลมพิษหรือปฏิกิริยาการแพ้รุนแรงขึ้นต่อริบพบ แพทย์ บางคนที่เป็นโรคภูมิแพ้รุนแรงต่อใช้อะดรีนาลีนฉีดตัวเอง แมงมุมส่วนใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงมนุษย์และกัดเฉพาะเมื่อติดกับดัก รอยกัดมักหายได้เอง แต่จะใช้น้ำแข็งประคบเย็น และยกแขนขาขึ้น ถ้ากัดที่ขาหรือแขนจะช่วยได้ ยาฉีดบาดทะยัก ยาแก้ปวด และยาคลายกล้ามเนื้ออาจจำเป็น ยา antivenin แมงมุมแม่หมาดำให้เมื่ออาการรุนแรงมาก เช่น หายใจลำบาก หรือสำหรับสตรีมีครรภ์ที่มีแมงมุมแม่หมาดำกัด สเตียรอยด์และยาแก้แพ้ อาจช่วยบรรเทาอาการคันจากการถูกทาแวนทูล่ากัด



ควรไม่ควร

- ✓ พกยาฉีดอะดรีนาลีนด้วยตนเองหากคุณรู้สึกไวต่อเหล็กไนนี้
 - ✓ กำจัดเห็บ (โดยเฉพาะที่หัว) โดยเร็วที่สุด
 - ✓ ควรพักผ่อนบริเวณที่ถูกแมงมุมกัด จัดให้อยู่ในที่สูง และใช้น้ำแข็งประคบ กินยาแก้ปวดตามที่กำหนด
 - ✓ พบแพทย์หากมีอาการหลังถูกกัด ตัดเชื้อหรือแพ้เช่น ลมพิษ คัน และหายใจลำบาก กลืนและพูดลำบาก
 - ✓ พบแพทย์หากแผลกัดมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือติดเชื้อ หากกำลังตั้งครรภ์หรือมีอาการปวดกล้ามเนื้อใหม่ ชัก หายใจลำบาก หรือปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
- ✗ อย่าไปในพื้นที่ป่าโดยไม่สวมเครื่องป้องกัน
 - ✗ อย่าเกาบริเวณที่ถูกกัด

