

# โรคปอดอักเสบจากการสั่นลักษณะ


โรคปอดอักเสบจากการสั่นลักษณะคือการอักเสบของปอดและทางเดินหายใจไปยังปอด (หลอดลม) เกิดจากการหายใจเข้าข้อสารประกอบกลุ่ม ซึ่งรวมถึงว่าหาด ของเหลว



อาเจียน หรือของเหลวไหลจากปากที่มีแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา ทำให้เกิดมากถึง 20% ถึง 35% ของโรคปอดบวมทั้งหมดและ 5% ถึง 15% ของโรคปอดบวมที่ได้มาจากการชุมชน

## สาเหตุ

ความเสี่ยงในการเป็นโรคปอดบวมนี้รวมถึงการกระตุ้นการสั่นลักษณะที่ไม่ดี (มักเป็นในผู้สูงอายุ) ก่อช่วยหายใจ ลำไส้อุดตันเครื่องช่วยหายใจและเครื่องพ่นยาที่ป่นเปื้อน ความเสี่ยงอื่น ๆ ได้แก่ อาการโคม่า โรคพิษสุนัร์เรื้อรัง และการดมยาสลบ ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง สมองเสื่อมหรือปัญหาการกลืน (เช่นในโรคกล้ามเนื้อต่อต้านแรง ALS และโรคพาร์กินสัน) และผู้ที่ได้รับยา เช่น ยาลดกรด ตัวบล็อก H2 ตัวยับยั้งโปรตอฟิลล์ และยาระวังประสาทยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคปอดอักเสบจากการสั่นลักษณะ



## อาการ

อาการที่พบได้บ่อย คือ มีไข้ ไอมีเสมหะ เสมหะสีเหลือง และหายใจลำบาก รวมถึงการเจ็บหน้าอก หนาหัวสัน สับสน ปวดศรีษะ หายใจติดขัด เหนื่อยออกแรง ความเหนื่อยล้า ผิวอาจดูเป็นสีน้ำเงินคล้ำ เพราะขาดออกซิเจน



## วินิจฉัย

การวินิจฉัยจะมาจากประวัติการแพทาย การตรวจร่างกาย (โดยให้ความสนใจกับปอดและลำคอ) เอ็กซ์เรย์ทรวงอก และเลือดและการตรวจสมหะ



## การรักษา

การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคปอดบวม ควรเริ่มใช้ยาปฏิชีวะกันที่สูงสัยว่าเป็นโรคปอดบวม สำหรับโรคไม่รุนแรงอาจใช้ยา



ปฏิชีวะในช่วงแรก พุ่คบมักจะเริ่มดีขึ้นภายใน 48 ถึง 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มการรักษา พุ่กที่ป่วยจากการหอบจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและได้รับยาปฏิชีวะหลายชนิด ให้ทางหลอดเลือดดำในครั้งแรกและกันยาต่อ. พุ่กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะได้รับอxygen ใจและการดูแลเป็นพิเศษเพื่อช่วยล้างสมอง เครื่องช่วยหายใจอาจจะเป็นต้องมีใช้ หากการหายใจยังคง ยาปฏิชีวะมักจะได้รับเป็นเวลา 7 ถึง 10 วัน การบำบัดสำหรับ 14 ถึง 21 วันให้วันหรือนานกว่านั้นสำหรับแบบที่เรียบง่ายประเภทและสำหรับพุ่กที่มีอาการป่วยเรื้อรังอีก

## ควรไม่ควร

- ✓ ทำตามคำแนะนำของแพทย์และพักผ่อนให้เพียงพอ
- ✓ บอกรักษาเดี่ยวๆ กับปัญหาการแพทย์อื่น ๆ และยาที่กินประจำ
- ✓ พบรักษาหากคุณมีอาการหายใจลำบากหรือไม่รู้สึกดีขึ้นหลังจาก 2 ถึง 3 วัน
- ✓ แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือกินยาคุมกำเนิด
- ✓ พบรักษาหากคุณต้องหันหน้าไปทางซ้ายหรือขวา
- ✓ พยายามไอให้ส่วนหัวหักให้มากที่สุด
- ✓ ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อหลอกเลี้ยงภาวะขาดน้ำ
- ✗ อย่าหยุดกินยาเพราเจรูสักดีขึ้น
- ✗ อย่าใช้ยาแก้ไอเพื่อรับประทานอาหารไอของคุณเว้นแต่พุ่กแพทย์จะบอกรักษา
- ✗ อย่ากินยาเม็ด ปวดอักเสบจากการสำลักอาจก่อให้เกิดไข้รับพบรักษา
- ✗ อย่าสูบบุหรี่หรือดื่มน้ำแอลกอฮอล์

