



ຝຶນະນ່ວງ Lymphogranuloma Venereum

Lymphogranuloma venereum (LGV)

ເປັນໂຮຄຕິດເຊື້ອແພຣ໌ກະຈາຍພ່ານກາງ
ເພສສັນພັບຮ່ວມ (ໂຮຄຕິດຕ່ວງກາງເພສສັນພັບຮ່ວມ). ມັກ
ເກີ່ຍວຂ້ອງກັບຕ່ວນນ້ຳເຫັນວ່າແລະວ້ຍວະເພສ ແລະ
ວາຈຍັງນີ້ພລຕ່ວງກວາຮ່ານັກແລະຂ່ອງປາກ ພບ
ນາກໃນດັ່ງເຂຕຮ້ວນແລະເຂຕຮ້ວນ ໂດຍກ່ົ້າໄປຈະ
ສັ່ພລຕ່ວັ້ນຢ່າຍນາກວ່າພູ້ທີ່ມີ ຂ່າງວາຍ 20 ດັ່ງ 40 ປີ



ສາເຫດ

ສາເຫດມາຈາກແບຄກີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີເພສສັນພັບຮ່ວມ
Chlamydia trachomatis ບອກຈາກການ
ແພຣ໌ເຊື້ອກາງເພສສັນພັບຮ່ວມ ແລ້ວ ການສັນພັສກັບ
ສິ່ງຂອງກີ່ພົກຕິດຕັ້ງ ແບຄກີ່ເຮັດວຽກຕິດຕ່ວັນໃນຄົນກີ່ມີເພສສັນພັບຮ່ວມ
ໄດ້



ວາກາຮ

ເຮັນມີວາກາຮ 1 ດັ່ງ 4 ສັປດາຫໍ່ຫັ້ງໄດ້ຮັບເຊື້ອແລະມີວາກາຮຕາມນາ ຕຸ່ມ
ພວງຂັ້ນກີ່ວ້ຍວະເພສແລະເປັນແພລແຕ່ຮັກໜາໄດ້ຮົວ ຈາກນັ້ນຕ່ວນ
ນ້ຳເຫັນວ່າມີການປົກກັນຂາຍໃຫຍ່ ແລ້ວ ແກ້ໄຂກົດເຈັບ ພິຈະເຕີມໄປດ້ວຍໜົນຂັ້ນແລະເລື້ອດ ມີຂໍ້
ປວດເນື່ອຍກລ້າມເນື້ອປວດສິຮະະ ເບື່ອວາຫາຮ ຄລື່ນໄສ້ ວາເຈີຍນ ແລະປວດຂ້ອງຮ່ວມດ້ວຍ



ວິນິຈວັຍ

ແພທຍໍກໍາການວິນິຈວັຍໂດຍຈາກສັນພັບຮ່ວມ ການສັນພັສ ການຕຽບ
ຮ່າງກາຍ ການຕຽບເລື້ອດ ຮວມດັ່ງການກົດສອບຕ່າງ ຫຼື ສໍາເຮັບ
ໂຮຄຕິດຕ່ວງກາງເພສສັນພັບຮ່ວມ ຫຼື ແພທຍໍຈາກເກີບຕົວວ່າງວ່ອງຈາກ
ຮອຍໂຮຄເພື່ອດູວ່າຕິດເຊື້ອແບຄກີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຮົວໃນໆ ການເຕີບໂຕ Chlamydia
ພິສູຈຸນໍ ແລ້ວ ວິນິຈວັຍຈາກການນີ້ແວນຕົບວັດຕ່ວ່າແບຄກີ່ເຮັດວຽກຖືກ ການ
ຕິດເຊື້ອກ່ວໂຮຄຟິນະນ່ວງ ແວນຕົບວັດຕົວໂປຣຕົບກີ່ເປັນສ່ວນຫົ່ງຂອງ
ຮະບບກຸບົກຸມກັນ



การรักษา

จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อและต้องได้รับ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ยาแก้ปวดที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ เช่น อะเซตอามิโนเฟน และไอوبูโรเฟน และความร้อนเฉพาะที่สามารถ ใช้รักษาได้ รู้สึกไม่สบายเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารพิเศษ แต่ควรได้รับสารอาหาร ก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการรักษา ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องทำการผ่าตัดหัวใจหลัง ที่ฟื้นฟู การว่างงานช้อน ได้แก่ การติดเชื้อเรื้อรัง และความผิดปกติของลำไส้และกระเพาะ ปัสสาวะ



ควรไม่ควร

- ✓ กินยาตามที่แพทย์สั่ง จนกว่าจะหมด
- ✓ ควรพักในระยะเวลาก่อนของการติดเชื้อ แล้วค่อยๆ กลับสู่กิจกรรมปกติ
- ✓ มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย-ใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนใหม่
- ✓ นัดหมายติดตามพลิกับแพทย์
- ✓ บอกคู่นอนของคุณเกี่ยวกับโรคของคุณเพื่อที่สามารถตรวจหาการติดเชื้อและรักษาได้
- ✓ พบรักษาหากคุณมีไข้สูงในระหว่างการรักษา.
- ✓ พบรักษาหากมีอาการปวดรุนแรงซึ่งมากไปกว่าที่ควรจะมี
- ✓ พบรักษาหากคุณมีอาการท้องเสียขณะรับประทานยาปฏิชีวนะ
- ✓ พบรักษาหากคุณไม่สามารถทนต่อได้
- ✓ อย่าลืมว่าคุณสามารถติดเชื้อนี้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง
- ✗ อย่ามีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน
- ✗ อย่าสัมผัสด้วยตาของคุณโดยไม่ล้างมือ
- ✗ อย่าเข้ามาขบادหรือหยุดใช้ยาปฏิชีวนะแม้ว่าสักเดือนสองแต่แพทย์จะบอกคุณ
- ✗ อย่ามีเพศสัมพันธ์จนกว่าแพทย์จะบอกว่าทำได้

