


Menorrhagia คือภาวะเลือดออกมากพิดปกติในระหว่างมensesประจำเดือนปกติ ผู้หญิงประมาณ 9% ถึง 14% มีประมาณ 10% ในช่วงวัยเจริญพันธุ์




สาเหตุ

ภาวะประจำเดือนมาก

เกิดขึ้นบ่อยในหญิงสาว นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นในสตรีสูงวัยที่ใกล้หมดประจำเดือน สาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ ตั่งบ่อ เนื้องอก ยาบางชนิด มะเร็งและการติดเชื้อ

อาการ

การ流血นานกว่า 7 วัน หรือเป็นหนักๆ สำหรับเด็ก 10 วันขึ้นไป และมีเลือดออกมากพิดปกติ ติดต่อกัน 2 รอบเดือน



วินิจฉัย

แพทย์จะทำการวินิจฉัยจากประวัติทางการแพทย์ การตรวจร่างกายและการตรวจเลือด (เพื่อตรวจหาโรคโลหิตจาง) โรคโลหิตจางเกิดขึ้นเมื่อการสูญเสียเลือดมากจนค่าเลือดของคุณต่ำเกินไป โรคโลหิตจางทำให้อ่อนเพลียและรู้สึกอ่อนแօ การตรวจพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ การตรวจ Pap test การตรวจขันเนื้อยื่นบุมดลูก การตรวจอัลตราซาวน์ การส่องกล้องในช่องท้อง การส่องกล้อง การตรวจฟอร์มดลูก, และ D&C (การขยายและการขูดมดลูก) สำหรับการตรวจขันเนื้อยื่นจะเก็บตัวอย่างเนื้อยื่นจะถูกเอาออกและดูดวิกล่องจุลทรรศน์ อัลตราซาวน์ใช้คลื่นเสียงถ่ายภาพมดลูก รังไข่ และกระดูกเชิงกราน สำหรับการส่องกล้องในช่องท้อง ใช้ก่อโลหะบางกีบ กล้องเล็ก ๆ ในนั้นพ่นปากมดลูกเข้าสู่ฟอร์มดลูกเพื่อมอง



เข้าไปข้างใน การส่องกล้องยังช่วยให้แพทย์สามารถตรวจดูช่องท้องผ่านการตัดขนาดเล็ก สำหรับ hysterosalpingography สัย้อมก์ใส่เข้าไปในมดลูกและห่อทำไข่ให้แพทย์เห็น เอ็กซเรย์มดลูก แพทย์ใช้ D&C เพื่อขยายปากมดลูกและนำตัวอย่างเยื่อบุมดลูกไปคีกษา

การรักษา


การเลือกการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ พลังงานเคียง และความชอบของพัฒนาการรักษาต่าง ๆ เช่น การกินยาและการพัฒนาการลดเลือดออกมากได้ ยาต่าง ๆ รวมถึงการคลอด ยาคุม



ฮอร์โนน (เช่น โปรเจสเทอโรน) และอาหารเสริมราตรีเหล็ก หากยาไม่ได้ผล อาจต้องพัฒนาตัดห้องพัฒน์ปั่นออก ซึ่งรวมถึง D&C และการพัฒนาพัฒนากล้องในโพรงมดลูก การพัฒนาอาจทำให้มีบุตรยากและมักเป็นกับพัฒนาหลังที่มีอายุมากที่ไม่ได้วางแผนที่จะตั้งครรภ์ การดำเนินการเหล่านี้รวมถึง endometrial ablation (เยื่อบุโพรงมดลูกถูกกำลังอย่างถาวร), endometrial resection (เอาเยื่อบุออก) และการตัดมดลูก (เอาหมดลูกและปากมดลูกออก) การพัฒนามดลูกเกี่ยวกับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ควรไม่ควร

- ✓ แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่คุณรับประทาน รวมถึงยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์
- ✓ ควรติดตามผลเมื่อจำเป็น
- ✓ พบรักษาของคุณหากอาการแย่ลงหลังการรักษาเริ่มต้น
- ✓ กินอาหารที่มีราตรีเหล็กสูง



✖ อย่ารอช้าที่จะรักษา อาจส่งผลให้มีเลือดออกเป็นเวลากว่าในภาวะโลหิตจางรุนแรง