



# กลุ่มอาการcarcinoid syndrome


กลุ่มอาการcarcinoid syndrome คือความผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อเนื้องอกขนาดเล็ก (เนื้องอกcarcinoïd) สร้างสารเคมีที่เข้าสู่ระบบหลอดสารเคมีทำให้เกิดอาการต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อออกที่เต็บโตข้าส่วนใหญ่พบในทางเดินอาหารและปอด (หลอดลม) เกิดขึ้นไปได้ตั้งเป็นส่วนใหญ่และบ่อยครั้ง ลำไส้เล็ก (20%); ลำไส้ (15%);

หลอดลม (12%) หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้ใหญ่ (10%); และรังไข่ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน (3%) พุ่คบมักจะคันพบรักษาความผิดปกติ เมื่อเนื้องอกกลุ่มตามมากและทำให้เกิดอาการนี้ โรคนี้หายากและเกิดขึ้นในประมาณ 3 ใน 100,000 คน



## สาเหตุ

เนื้องอกของcarcinoid syndromeสามารถสร้างสารเคมีที่เรียกว่า เชโรโนบิน แบรเดิลิน แลร์สตานบิน เป็นต้นเนื้องอกเต็บโตจากเซลล์พิเศษที่เรียกว่า เซลล์ประสาท. สาเหตุของเนื้องอกไม่ชัดเจน



## อาการ

อาการหลักคือพิวหนังแดง (75% ถึง 90%) ก้องเสีย ปัลสูชา การหายใจ รอยโรคที่พิวหน้า และบางครั้งเกิดหัวใจเต้นเร็ว สายแดงม่วงมักจะเริ่มที่ใบหน้าและลามไปที่คอและลำตัวส่วนบน และหายใจในเวลาไม่ถูกก่อตัว หากใช้เวลานานอาจเกี่ยวข้องกับสารก่อมะเร็งในหลอดลม อาจกระตุ้นการบล์โลกลอหิต หรืออาหาร วุบวาบ แต่อาการวุบวาบอาจเกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า วิงเวียนอย่างรวดเร็ว การเต้นของหัวใจที่เร็ว และความดันโลหิตต่ำ อาจเกิดขึ้นกับการขับออกน้ำร่างกาย อาการก้องเสียเกิดขึ้นมากกว่า 70% ของประชากร มักเกี่ยวข้องกับก้องอ้วด ปัลสูชา การหายใจ ได้แก่ การหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบในหลอดลม พลลัพธ์คือหายใจดี และหายใจเสียงวีด



## ວິນິຈອີຍ

ແພທຍໍ ຂັດປະວັດຕີ ຕຣວຈຮ່າງກາຍ ເອກຊຣຍໍຖຽງອຸດ Computed Tomography (CT) ຂອງຫ່ວັງກ້ວງ ແລະ ດາວໂຫຼວງ ທາງຫ່ວັງປັບປຸດຕົກ ດາວວັດຮະດັບສາຣເຄມືກໍ່ພັດຕະໂດຍເນື້ອງວຸດ ອາຫາຣແລະ ຍາສາມາດກຳໃຫ້ພົບຮະດັບສາຣເຄມືສູງຂັ້ນພົດປົກຕີ ກລ້ວຍ ສັບປະຣດ ມະເຂົ້ມ່ວງ ວະໂວຄາໂດ ແລະ ວອລນັກສາມາດກຶດໄດ້ ຍາກີ່ວ່າຈາກກຳໃຫ້ເກີດກາຣເພີ່ມຮະດັບກໍ່ພົດພລາດ ໄດ້ແກ່ ວະເຊຕາມືໂນແພບຄາເຟວັນ octreotide ແລະ reserpine ດ່ວນກາຣກົດສອບນັ້ນພູ້ປ່ວຍຕ້ອງນີ້ຈຳກັດຈາຫາຣແລະ ພລັດເລື່ຍງຢາເໜຸ້ານີ້ ຈາກວຸນດົງກາຣກົດສອບພິເສດຖະໜີໄວ້ໂວດັນກັນນັບຕາພຮັງສີເພື່ອຕິດ somatostatin ເພື່ອຄັນຫາເນື້ອງວຸດ ແພທຍໍຈາກແນະນຳໃຫ້ພົບພູ້ເຊື່ຍວ່າລຸ່ມເຂົ້ມ່ວງວຸດແພທຍໍຕ່ອມໄຮກ່ອງແລະ ຄັລຍແພທຍໍຕ່ອມໄຮກ່ອງ



## ກາຣຮັກຫາ

ກາຣຮັກຫາໂຮຄ່າມາຍດົງກາຣຮັກຫາເນື້ອງວຸດ ກາຣພ່າຕັດຈາກຕ້ອງກຳເພື່ອເອາເນື້ອງວຸດ ມາກກາຣພ່າຕັດໄນ່ສາມາດກຳຈັດເນື້ອງວຸດກໍ່ແພຣ່ກະຈາຍເປັນວຸງກວ້າງໄດ້ ຍາຈາກກຳໃຫ້ເນື້ອງວຸດຕົວແລະ ຄວບຄຸມຈາກກາຣໄດ້ ຍາເໜຸ້ານີ້ຮຸນດົງກົງ octreotide ແລະ interferon alfa ກາຣອຸດຕັບຂອງຮລວດເລື່ອດແດງຕັບແລະ ຄວາມຮ້ອນຮ້ອກກາຣແຂ່ງເຂົ້າຂລຄໍເນື້ອງວຸດ ຈາເປັນກາງເລືອກໃນກາຣຮັກຫາໃນພູ້ປ່ວຍບາງຮາຍ



## ຄວຣໃນໝວງ

- ✓ ຈົດເຄື່ອງດື່ນແວລກວ່ອວຸດ ຈາກກຳໃຫ້ຫັນ້າແດງໄດ້
- ✓ ກົນຈາຫາຣໃຫ້ສົມດຸລ ແລະ ພລັດເລື່ຍງຈາຫາຣນີ້ໃຫຍ່
- ✓ ຕິດຕາມສິ່ງທີ່ກຳໃຫ້ເກີດຈາກກາຣແລະ ພລັດເລື່ຍງສິ່ງເໜຸ້ານັ້ນ
- ✓ ເຮັນຮູ້ໃຫ້ນາກທີ່ສຸດເກີຍກັບຄວາມເຈັບປ່ວຍຂອງຄຸລ
- ✗ ອຍ່າເພັດເຈຍຕ່ອງກາຣ ຮັບພົບແພທຍໍ
- ✗ ມາກຈາກກາຣຂອງຄຸລໄຟ້ດີຂັ້ນຫົວແຍ່ງລົງຈາກກາຣຮັກຫາ ພົບແພທຍໍມາກຄຸລນີ້ຈາກກາຣໃໝ່
- ✗ ອຍ່າຫຼຸດການຢາເຮົວເປີ່ຍນັບນາດຢາແນ້ນຮູ້ສຶກດີຂັ້ນເວັນແຕ່ແພທຍໍບອກຄຸລ
- ✗ ຜ້ານໃຫ້ຢາໃດ ທ່ານດົງຢາກໍ່ຊ້ອເວງ ແລະ ພລັດກົລກກໍ່ສຸມນູນໄຟຣ ໂດຍໄຟ້ສອບກາມແພທຍໍກ່ອນ

