


เรียกอีกอย่างว่าโรคแหบเชน โรคเรื้อรานเป็นโรคการติดเชื้อเกี่ยวกับพิวหนังและสั่นประสาทเป็นหลัก จำนวนเคสลดลงทั่วโลก ตอนนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 650,000 รายได้รับการวินิจฉัยทุกปี



ผู้ป่วยโรคเรื้อรานเกือบสามในสี่เกิดขึ้น ในอินเดีย บราซิล บังคลาเทศ อินโดเนเซีย และเมียนมา ฯ เกี่ยวกับ 150 รายใหม่เกิดขึ้นทุกปีในสหราชอาณาจักร มากกว่า 85% ใน การอพยพมีส่วนประกอบของbacillary หรือ multibacillary ในโรคเรื้อราน paucibacillary คับนีแพลที่พิวหนังน้อยกว่าห้าแพลและไม่พบแบคทีเรีย ในโรคเรื้อราน multibacillary คับนีแพลที่พิวหนังมากกว่าห้าแพลหรือมากกว่าและพบแบคทีเรียในผู้คนมากกว่า พันชั้ย สามารถเกิดได้ทุกวัย แต่มักเกิดขึ้นในเด็กเล็ก สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ (ผ่านทางเดินหายใจ ทางเดินอาหารหรือพิวแทรกเป็นแพล) แต่ความเสี่ยงในการจับกันน้อย พบโรคเรื้อรานในระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยไม่ผิดข้างเคียง

### สาเหตุ

สาเหตุคือแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เรียกว่า *Mycobacterium leprae*




### อาการ

พิวหนังและสั่นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและความรู้สึกในแขนและขาได้รับผลกระทบ ผื่นหรือก้อนที่เรียกว่าตุ่มบุบ รอยโรคที่พิวหนังอาจดูเข้มขึ้น หรืออาจลงกว่าปกติ ก้อนมีจุดศูนย์กลางที่ชัดเจนโดยสุลใส่ความรู้สึกบริเวณที่เป็นแพลไม่สามารถขับเหงื่อได้ คล้ายคนบ่นถึงความรู้สึกเหมือนหมุดและเข้มตำจิตๆที่มือ หรือเท้า และบริเวณก้อนตามสั่นประสาทโดยเฉพาะที่แขนและขา พลของสั่นประสาททำให้กล้ามเนื้อทำงานแรงและลีบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมือและเท้า มือและเท้าไม่สามารถหดตัวและใช้



งานไม่ดีและปลายเท้าตกและเก็บนิ้ว โรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทใบหน้าอาจทำให้สับ  
จมูกยุบ มีปัญหาการปิดเปลือกตาบบ และคิ้วหาย



### วิธีจัดการ

จากประวัติการการแพทย์และการตรวจร่างกาย แบบที่เรีย<sup>จะ</sup>จะพบรอยที่พิเศษหรือการตรวจขึ้นเนื้อ การสมัยร<sup>โดย</sup>โดยการขุดพิเศษ โดยการถกตัวอย่างแบบสไลด์และดู เชลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์



### การรักษา

บากไหยาปฏิชีวนะ (rifampin, dapsone) สำหรับโรค  
เรื้อรังtuberculosis ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง<sup>คง</sup>คงตัว แพทย์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อควรมีส่วนร่วมในการดูแล

### ควรไม่ควร

- ✓ ควรใช้ยาตามที่กำหนด
- ✓ ควรดูแลเท้าและรองเท้าที่เหมาะสมหากโรคเรื้อรังเกี่ยวข้องกับขาและเส้นประสาทเพื่อป้องกันการสลายของพิเศษและเป็นแพล
- ✓ ควรพบผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
- ✓ ควรพบแพทย์หากมีพิเศษ ก้อนเนื้อบนพิเศษ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือรู้สึกเจ็บๆ เมื่อเข็นต่ำที่แขนหรือขา
- ✓ ควรพบแพทย์หากคุณมีผลข้างเคียงของยา



✗ อย่าพลาดการนัดหมายติดตามผล

✗ อย่าลืมว่าถ้าแม้เสี่ยงเป็นโรคเรื้อรัง สมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิดควรตรวจเช็คบ่อย ๆ