

โรคกล้ามเนื้อหัวใจบิดห้องหัวใจขยายใหญ่เป็นโรคของกล้ามเนื้อหัวใจที่บ้องกันกล้ามเนื้อจากแรงกดตัวของกล้ามเนื้อดังนั้นหัวใจจะไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะในร่างกายได้เพียงพอ หัวใจจะอ่อนแอกล้ามเนื้อหัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้น (ขยาย) ห้องเหล่านี้คือหัวใจห้องบนและห้องล่างหัวใจ กล้ามเนื้ออาจหายขึ้นเพื่อให้มีแรงมากขึ้นในการกดตัวเพื่อเลือดสูบฉีดได้ตามปกติ ลับหัวใจอาจได้รับผลกระทบเมื่อหัวใจใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจทำให้การไหลเวียนบaffle ลง การทำงานของหัวใจบกพร่องอาจส่งผลต่อปอด ตับ และอวัยวะอื่น ๆ



สาเหตุ

สาเหตุไม่ทราบแน่ชัด ปัจจัยที่ทำลายกล้ามเนื้อหัวใจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้ ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดี โรคโลหิตจางและโรคลิบหัวใจ สารเคมีที่เป็นอันตราย (เช่น ออกไซด์) การติดเชื้อ ยา โคเคน เฮโรอิน และบางชนิด โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวกับพันชาทำให้เกิดโรคได้ โรคกล้ามเนื้อหัวใจบิดห้องหัวใจขยายใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงสารเคมีอันตราย เช่น ออกไซด์ อาจลดความเสี่ยงในการเป็นโรค



อาการ

คนส่วนใหญ่รู้สึกเหนื่อย (เมื่อยล้า) ออกกำลังกายบ่อยๆ หรือหายใจเร็วสัน. อาการบวมที่ขาหรือท่า เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็วและใจสั่น (รู้สึกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ) อาจเกิดขึ้นด้วย




วินิจฉัย

หากประวัติ ตรวจร่างกายรวมถึง การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) และจะทำการห้องหัวใจที่สามารถส่องหัวใจได้ แพทย์จะแนะนำให้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (cardiologist) สำหรับการ

กดสอบเพิ่มเติม เช่นการกำ Echocardiography (การตรวจอัลตราซาวนด์ของหัวใจ) หรือ angiography (การตรวจเอ็อกซ์เรย์พิเศษเพื่อ ตรวจเลือดใหญ่ผ่านหัวใจ) อาจทำเพื่อ ตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยหาย


การรักษา

การบำบัดมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอาการและแก้ไขจังหวะการเต้น ของหัวใจพิດปกติ (arrhythmias) ลดการบริโภคเกลือกและการ พักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญ อาจจำเป็นต้องทำการพั่ตัดลิ้นหัวใจสำหรับ ลิ้นที่เสียหาย หากกราบสาเหตุของโรคกล้ามเนื้อหัวใจโตและรับการ รักษาตามสาเหตุ แพทย์อาจสั่งยาให้ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ และขยายหลอดเลือดยาขับปัสสาวะ และอาหารเสริม อาจมีการใส่ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุในหน้าอกใบคบก็ต้องต่อสายได้ไม่ดี ถ้าการสูบ จิตของหัวใจมีความบกพร่องอย่างรุนแรงและมีอาการของหัวใจความล้มเหลวอย่าง มากถูกด้วยหัวใจมักพิจารณาทำใบพัคบวัยหุ่นสาว



ควรไม่ควร

- ✓ ลดปริมาณโซเดียม (เกลือ) และของหวานในอาหาร.
- ✓ กินยาครบทามที่กำหนด
- ✓ พบแพทย์หากคุณมีหน้าอกใหเมื่อหรืออาการแย่ลง มีปวด หายใจดี ข้าววม หรือเป็นลม



- ✗ อาย่าดื่มแอลกอฮอล์
- ✗ อาย่าออกกำลังกายหนักๆ จนกว่าแพทย์อนุญาต
- ✗ อาย่าใช้ยาสารเสพติดเช่น โคเคน เฮโรอีน ฯลฯ อาจทำให้ กล้ามเนื้อหัวใจโตได้