



เป็นภาวะที่เกิดเต้าบมข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างที่ขยายใหญ่ขึ้นในเพศชาย บุคคลเกิดในกลุ่มคนสามวัย: เด็กแรกเกิด เด็กพุชชาย อายุ 12 ถึง 16 ปี และมากกว่า พุชชาย ในเด็กพุชชาย เต้าบมอาจลับมาเป็นปกติใน 6 เดือนถึง 3 ปีหลังจากวัยแรกรุน



ສາມາດ

สาเหตุปักตีในเด็กพัฒนาช้าคือการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในระหว่างวัยแรกรุ่น การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนสามารถเกิดขึ้นได้ในเด็กพัฒนาช้าและพัฒนาเร็วที่มีอายุ ยาบางชนิด ยาที่พัฒนาช้า และยาที่ใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อสามารถทำให้เกิดภาวะ เต้านมโต เช่นเดียวกับอาหารและเครื่องดื่มน้ำก็จะเหลืองมากเกินไป สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ เนื้องอก การเกิดก้อนพัฒนาช้าและโรคตับ





סימן

หน้าอกให้ใหญ่กว่าพั้นช้ายก็ว้าไป พื้นที่ของเนื้อยื่น สามารถคลำได้หลังหัวบม หน้าอกอาจจะกดเจ็บแต่ไม่ใช่บกจะเจ็บปวด วีบีจวัยแพกย์สามารถกิวบีจวัยภาวะเต้านบม โดยการตรวจร่างกายบริเวณหน้าอกและกรุงอก อาจทำการตรวจเลือดเพื่อตรวจส่วนระดับฮอร์โมนและน่องหาสาเหตุอื่น ๆ บางครั้งอื่น ๆ การตรวจต่าง ๆ เช่น แบบบอนีเกรนและซีบอนีแกรนบของเต้านบมจำเป็นเพื่อแยกเบื้องอกในเต้านบออก



กิจกรรม

การรักษาความกึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อส่งเสริมการลดน้ำหนัก การหลีกเลี่ยงยาที่เกี่ยวข้อง กาวะเต้าบันมโตในเพศชายหรือการพั่วตัด ulatory ครั้ง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและผู้อยู่อาศัยเดียวที่เพียงพอแล้ว



เด็กชาย 12- 16 ปี และการรักแรกรเกิดมักไม่ได้รับการรักษา ถ้าสภาวะมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี ก็มักจะตอบสนองการรักษาได้ดี มันอาจจะไม่หายไปในคนที่วัยก่อโรคเต็มที่และมีภาวะเต้านมโต ยาวนานกว่า 1 ปี สำหรับปัจจุบันจะดับช่องโถใน ยาอาจปรับสมดุลของระดับและอาจช่วยให้เนื้อเยื่อเต้านมกลับสู่ภาวะปกติ แพทย์อาจแนะนำให้พับผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่า อาญูรแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาช่องโถ เมื่อการรักษาอื่น ๆ ล้มเหลว การผ่าตัดที่เรียกว่า *breast reduction surgery* สามารถผ่าตัดลดขนาดและ เอาเนื้อเยื่อเต้านมออกได้ การผ่าตัดนี้คือ โดยทั่วไปคิดว่าเป็นเรื่องความสวยงามและ ประภัยสุขภาพอาจไม่ครอบคลุม

គោរម៉ែកវា

- ✓ แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่คุณรับประทาน
  - ✓ แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่คุณใช้
  - ✓ แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณรู้สึกไม่สบายขณะรับประทานยาสำหรับภาวะเต้านมโต
  - ✓ พูดคุยกับแพทย์หากคุณไม่สบายใจเกี่ยวกับภาวะนี้
  - ✓ ลดน้ำหนักหากคุณมีน้ำหนักเกิน
  - ✓ พูดแพทย์หากหน้าอกร่องของคุณเจ็บหรือแดงเพราะอาจติดเชื้อได้



- ✖️อย่าดื่มน้ำอัดลมมากเกินไป
  - ✖️อย่าใช้ยาพาราเซตามอล
  - ✖️อย่าใส่เสื้อผ้าที่รัดตัวมาก
  - ✖️อย่าใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำหอม เช่น น้ำหอม น้ำยาอาบน้ำ ครีมบำรุงผิว