



# Shigellosis โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา

Shigellosis คือการติดเชื้อในลำไส้ ด้วยแบคทีเรีย เชื้อชิเกลลา มากกว่า 15,000 ราย ต่อปีเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร ประเทศต่อเด็กและสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก



## สาเหตุ

Shigellosis คือการติดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากแบคทีเรียสายพันธุ์ Shigella Shigella sonnei เป็นสายพันธุ์ที่แยกได้บ่อยที่สุดในสหราชอาณาจักร เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคบิด ในสหราชอาณาจักร การแพร่กระจายมาจากการสูบบุหรี่ส้มผักไขกล้วยชีด มันมักจะพ่นไปกับอาหารหรือน้ำที่ปูนเปื้อน ขยายรักษามีความเสี่ยงสูงได้รับเชื้อเนื่องจากการสัมผัสทางปากทางทวารหนัก



## อาการ

เวลาฟึกตัวสามารถอยู่ได้ 1 ถึง 7 วันโดยเฉลี่ย 3 วัน อาการ รวมถึงไข้ อาเจียนให้เป็นไข้สูงในเด็ก และ adenorectal ของท้อง ท้องเสียเป็นน้ำ คลื่นไส้อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ บุกเลือดปนมากับอุจจาระ โรคครูบแวง พบร้าในเด็ก และคนสูงอายุ และในประเภทที่มีสุขภาพไม่ดี



## วินิจฉัย



แพทย์สังสัยโรคบิดจากเชื้อชิเกลลาเนื่องจากประวัติทางการแพทย์และการตรวจร่างกาย การได้รับอุจจาระ

จำเป็นต้องมีตัวอย่างเพาะเชื้อเพื่อการวินิจฉัย ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ อาจทำการทดสอบเพื่อแยกแยะโรคก่อคلحยคลึงกัน

## การรักษา

การรักษาหลักคือการดื่มน้ำให้เพียงพอและอิเล็กโกรไอลต์สูญเสียไปกับอาการท้องเสีย อาจให้ยาปฏิชีวนะลดระดับเวลาการเจ็บป่วยและป้องกันการส่งต่อไปยังผู้อื่น ถ้าเป็นไปได้ ผู้ติดเชื้อควรใช้น้ำยาห้องน้ำแยกต่างหาก ถ้าไม่ได้ควรสวมถุงมือและขัดห้องน้ำด้วยน้ำยาฟอกขาวหลังการใช้งานทุกครั้ง การล้างมือด้วยสบู่เป็นสิ่งที่ดีหลังจากใช้ห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร เพื่อลดอาการท้องเสีย ควรรับประทานอาหารเหลว (จาลาติน, ชุป) จากนั้นควรเพิ่มอาหารข้าว ๆ แต่ไม่กินพลอย และพักดับ ไม่ควรใช้ยาต้านอาการท้องเสีย เพราะทำให้แบคทีเรียดูดกำจัดได้ไม่ดีและทำให้เจ็บป่วยได้มากขึ้น เช่นห้องน้ำจะหายใจและท้องเสีย พั๊ปูเตียงและเสื้อผ้าควรซักด้วยน้ำสบู่และน้ำร้อนที่สุด



## ควรไม่ควร

- ✓ รับประทานยาปฏิชีวนะตามที่กำหนดจนกว่าจะหมด
- ✓ ล้างมือให้สะอาดหลังใช้ห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร
- ✓ เพิ่มปริมาณเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ
- ✓ พบรแพกท์หากมีอาการปวดท้อง บวม หรือมีไข้ ระหว่างการรักษา หรือมีเลือดในอุจาระของคุณ รวมถึงขาดน้ำ (น้ำหนักลด พิวแท้ ตาแดง หรือต้องปัสสาวะบ่อยๆ) หากใจดีหรือข้อต่อปวด



- ✗ อย่าใช้ยาที่ไม่ได้สังโถด้วยแพกท์เพื่อหยุดอาการท้องเสีย
- ✗ อย่ากินอาหารเข็งจนกว่าอาการท้องร่วงจะช้าลง
- ✗ อย่ากินพักและพลอยไม้ดีบวนกว่าจะติดเชื้อหายไปหมด