



เป็นการบวมและระคายเคืองของส่วนปลายขององคชาติ พบได้บ่อยในชายที่ยังไม่ผ่านการขลิบอวัยวะเพศ มีอาการอักเสบบริเวณผิวหนังที่คลุมองคชาติ ดังนั้นผู้ที่ขลิบแล้วจะไม่มีอาการนี้พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่



สาเหตุ

การติดเชื้อยีสและแบคทีเรีย ติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะ การติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่รักษาความสะอาด การใช้สารหล่อลื่น การบาดเจ็บ หรือหนังหุ้มที่รัดองคชาติแน่นเกินไป

อาการ

มีอาการบวมแดงร้อนบริเวณส่วนปลายของผิวหนังองคชาติ ปวดและปัสสาวะยาก ควบคุมปัสสาวะไม่ได้ สารคัดหลั่งกลิ่นเหม็น หากไม่รักษาอาจจะเป็นตุ่มน้ำ และแตกเป็นแผล



วินิจฉัย

ซักประวัติตรวจร่างกาย อาจเก็บสารคัดหลั่งมาเพื่อเพาะเชื้อดูว่าเป็นแบคทีเรียหรือยีส ตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อที่แรงกว่า เช่น เบบางาน ซีพีจีเอส

รักษา

พิวหนิงอักเสบ ต่อมลูกหมากอักเสบ
ตอบสนองการรักษาอย่างดี การรักษาขึ้นอยู่กับ
กับ อายุ สาเหตุ และบุคคลที่ยังไม่ได้ขลิบ
รักษาโดยการเปิดหนังหุ้มปลายขึ้นและแช่น้ำอุ่น
หากอาการไม่รุนแรงเพียงใช้ยาปฏิชีวนะกา
บริเวณนั้น หากมีอาการรุนแรงอาจต้องกินยาปฏิชีวนะ หากพบติดเชื้อรา ยาทาเชื้อ
ราทาบบริเวณแฉก ให้สตียรอยดื่เพื่อลดบวม การหายของแผลขึ้นอยู่กับสาเหตุและ
การปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ หากอาการไม่รุนแรงจะหายได้ภายใน 5-10วัน
หากรุนแรงจะใช้เวลานานกว่า



ควรไม่ควร

- ✓ ควรรักษาความสะอาดโดยการเปิดหนังหุ้มปลายและล้างส่วนปลาย
ขององคชาติ
- ✓ ควรใส่ถุงยางขณะมีเพศสัมพันธ์
- ✓ ควรใช้ยาทาหรือยากินปฏิชีวนะตามแพทย์สั่ง
- ✓ ควรใช้สบู่เพื่อให้เปิดหนังหุ้มปลายง่ายขึ้น
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 3-4วัน
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากมีหนองหรือเลือดออกทางอวัยวะ



✗ ไม่ควรหยุดยาปฏิชีวนะก่อนยาหมดแม้ว่าอาการ
จะดีขึ้นแล้ว