





ภาวะหัวใจล้มเหลว

Congestive heart failure เป็นภาวะหัวใจไม่สามารถปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ เลือดกักคลับทำให้เกิดบ้ำบิเรเวณหัวใจที่พัฒนาต่อไปไม่สามารถระบายสูสู่ส่วนอื่นได้ ดึงแม่หัวใจห้องซ้ายจะล้มเหลว แต่สามารถมีอาการของหัวใจห้องขวาล้มเหลวได้เช่นกัน



สาเหตุ

โรคที่เกิดจากความเครียดของกล้ามเนื้อหัวใจ ส่งผลทำให้เกิดความดันสูง การเต้นของหัวใจ โรคหัวใจและลิ้นหัวใจ การติดเชื้อ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะชด โรคไตรอยด์ โรคเยื่อหุ้มปอด



อาการ

เมื่อหัวใจด้านซ้ายล้มเหลวและซึมพ่านปอด ทำให้เหนื่อย หายใจลำบาก โดยเฉพาะกลางคืนขณะหลับ ไอ หอบเหนื่อย หากเป็นหัวใจด้านขวาล้มเหลว ตับโตขึ้น ก้อนและขาบวมกับก้อนส่องข้าง



วินิจฉัย

จากการตรวจร่างกาย หายใจเหนื่อยเนื่องจากบ้ำก่ำปอด ขาบวนกับก้อนส่องข้าง ตรวจเอกซเรย์ปอด พบรากดหัวใจใหญ่ บ้ำสูงในปอดและหัวใจ ซึ่งการทำ ECHO เพื่อดูขนาดและโรคของกล้ามเนื้อหัวใจ และลิ้นหัวใจ




การรักษา

อาการเรื้นแรกควรรับรักษาเพื่อไม่ให้หัวใจทำงานหนัก ร่วมกับรักษาสาเหตุด้วย ลดการกัดเหล้าสูบบุหรี่ จำกัดน้ำและเกลือ หากมีน้ำหนักเกินควรลดน้ำหนักแล้วงแพลงการกินอาหาร ให้ออกซิเจนเพื่อลดการทำงานของปอด ยาขับปัสสาวะกำจัดน้ำ ลดความดันและขยายหลอดเลือดด้วยยา ไนเตรท ยา acei ช่วยลดการบีบตัวของหัวใจ beta blocker ลดความเร็วของการเต้นหัวใจ การนำ pacemaker ฝังบริเวณหัวใจ และการเปลี่ยนถ่ายหัวใจ



ควรไม่ควร

- ✓ ควรกินยาส้ม่าเสบอ
- ✓ ควรควบคุมน้ำหนัก
- ✓ ควรจำกัดน้ำและเกลือ
- ✓ ควรรับแพลงการกินหากมีพลังงานเคียง เช่น หายใจเร็วดี แน่น้ำอุด เป็นลม



- ✗ ไม่ควรลืมกินยาให้ตรงเวลา
- ✗ ไม่ควรสูบบุหรี่
- ✗ ไม่ควรหยุดยาเอง

