



เป็นโรคติดเชื้อไวรัสระบบผิวหนังหน้าหนาวและฤดูใบไม้ผลิ
 ลักษณะจะเป็นผื่นเกดขึ้นบนหน้า ชื่อของโรคขึ้นอยู่กับสถานที่ที่
 พบเด็กเป็นโรคนี้ พบได้ในเด็กช่วงอายุ 5-14ปี โรคนี้ไม่
 สามารถป้องกันได้และไม่เป็นโรคติดต่อ ผู้ที่เคยไม่มีอาการจะ
 ไม่เป็นซ้ำเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเรียบร้อยแล้ว ใน
 ผู้ป่วยสุขภาพดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่เด็กที่เป็นโรคชนิดชัค
 เกลอยู่เดิมจะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน หญิง
 ตั้งครรภ์สามารถแท้งได้หากมีอาการติดเชื้อช่วงตั้งครรรภ์
 มาสแรก



สาเหตุ

จากไวรัส human parvovirus B19 แพร่ทาง
 อากาศ



อาการ

จะแสดงอาการออกมาใน 4-14 วันหลังติดเชื้อ โดย
 ปกติจะมีอาการอยู่ประมาณ 5-10 วันเช่น ผื่นแดงบริเวณแก้มสองข้าง อาจมีอาการ
 เหนื่อย ปวดหัว คันเกิดขึ้นด้วย บางคนมีไข้ สำหรับผู้ใหญ่อาจมีปวดบวมตามข้อได้
 เล็กน้อย แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีอาการ


วินิจฉัย

จากการซักประวัติตรวจร่างกาย และไม่จำเป็นต้องตรวจ
 เลือด



การรักษา

ไม่มีการรักษาที่จำเพาะเจาะจง ให้ยา acetaminophenบรรเทาอาการปวดได้ ห้ามให้แอสไพรินเพราะอาจเกิดภาวะอกรกซ้อนได้เช่น Reye's syndrome.



ควรไม่ควร

- ✓ ควรนอนพักผ่อนมาก ๆ ขณะรักษา
- ✓ ควรให้ดื่มน้ำมาก ๆ
- ✓ ควรใช้คาลามายทาหากมีอาการคัน
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากมีอาการแสบ



- ✗ ไม่ควรให้แอสไพรินในเด็กป่วยโรคไข้
- ✗ ไม่ควรกังวลว่าพื่นจะเกิดซ้ำ โดยเฉพาะตอนออกแดด หรืออุณหภูมิเปลี่ยน