



เป็นภาวะที่ทำให้หลอดเลือดแดงกลายเป็นอักเสบหรือบวมเรียกอีก
อย่าง temporal arteritis เพราะจากการอักเสบของหลอดเลือดแดงที่
สองข้างบริเวณขมับ อย่างไรก็ตามหลอดเลือดแดงบริเวณอื่นก็
สามารถอักเสบได้ การอักเสบทำให้หลอดเลือดตีบแคบลง เกิดหลอด
เลือดอุดตัน ไม่สามารถเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ หากเป็นที่ตาอาจทำให้ตาบอด
ได้



สาเหตุ

อาการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับหัวและหน้า ปวดหัว เจ็บหนัง
ศีรษะ โดยเฉพาะบริเวณขมับ ปวดกราม ลิ้น เมื่อเคี้ยว
หรือพูด เห็นภาพเบลอหรือภาพซ้อน อาการเหมือน
ไข้หวัดใหญ่ เช่นปวดกล้ามเนื้อ ข้อติด ไข้ เหนื่อยล้า ไม่
อยากอาหาร



วินิจฉัย

จากการซักประวัติตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ดูค่าการ
อักเสบคือ ESR อาจต้องตัดชิ้นเนื้อหลอดเลือดบริเวณ
ขมับมาตรวจ การเอกซเรย์ช่องปอดยังเพิ่มความเสี่ยงเกิด
เส้นเลือดโป่งพองบริเวณทรวงอกซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงหลักที่
กระจายเลือดไปสู่บริเวณต่าง ๆ



รักษา

ให้เพนนิซิลิน 40-60 มิลลิกรัมต่อวัน กิน
ต่อเนื่อง 1 เดือน หากอาการดีขึ้นจะค่อยๆ ลด
ปริมาณยาลง ระยะเวลาการรักษาใน 1-2 ปี ใน
คนที่การมองเห็นแย่งควรให้ยาฉีด methylprednisolone ทั้งหมด 3-5 วัน



ควรไม่ควร

- ✓ ควรกินยาให้ครบตามแพทย์สั่งแม้อาการดีขึ้นแล้ว
- ✓ ควรบอกแพทย์หากมีผลข้างเคียงจากยา
- ✓ ควรรีบบอกแพทย์หากไม่ดีขึ้นเมื่อรักษามาเป็นสัปดาห์
- ✓ ควรทราบว่า การกินยาเพนนิซิลินนาน ๆ ก่อให้เกิดต่อ
กระจาก แผลในกระเพาะ กระดูกเสื่อม เบาหวานและความ
ดัน
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากการมองเห็นแย่ง
- ✓ ควรรีบแจ้งแพทย์หากมีอาการปวดหัวใหม่ ไข้หรือปวดเวลาเคี้ยวอาหาร



- ✗ ไม่ควรพลาดนัดแพทย์
- ✗ ไม่ควรล้มการรักษาด้วยเพนนิซิลินต่อรักษา
1-2 ปี เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ
- ✗ ไม่ควรละเลยอาการตาพละมัว อาจตาบอดได้
หากรักษาช้า