



เกิดในเด็กทารกที่ท่อปัสสาวะสั้นกว่าปกติทำให้เปิดออกสู่
ภายนอกบริเวณส่วนแกนขององคชาติแทนที่จะเป็นส่วน
ปลาย มีตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยไปมาก



สาเหตุ

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่เรื่องของพันธุกรรม โรคต่อมไร้ท่อ สิ่งแวดล้อมมีผล

อาการ

ทางเปิดของท่อปัสสาวะเปิดออกสู่ภายนอก
ส่วนกลางหรือท้ายของแกนองคชาติ ในผู้ชายบางคนมี
ปัญหาการบดบังทิศทางในการปัสสาวะ จำเป็นต้องนั่ง
เวลาปัสสาวะ




วินิจฉัย

จากการซักประวัติตรวจร่างกาย แนะนำให้ปรึกษาแพทย์
ศัลยกรรมทางระบบปัสสาวะ

การรักษา

การผ่าตัดเปิดท่อทางเดินปัสสาวะใหม่ ยิ่งทำได้เร็วยิ่ง
ได้ผลดี และช่วงที่ดีที่สุดคือช่วง 6-12เดือน ผู้ใหญ่ใช้วิธี
ผ่าตัดเช่นเดียวกัน หลังจากผ่าตัดเปิดท่อปัสสาวะใหม่
สำเร็จแพทย์จะใส่ท่อค้ำไว้ สามารถปัสสาวะได้ปกติ อาจมีเลือดปนออกมาได้ และ
แพทย์จะสั่งยาลดอาการปวดและยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หลังจากนั้น 10
วันแพทย์ทำการถอดสายออกเพื่อประเมินผล เด็ก ๆ สามารถใช้ชีวิตปกติรวมถึงการ
มีเพศสัมพันธ์ได้ปกติเมื่อโตขึ้น หากภาวะท่อปัสสาวะเปิดพิดที่ไม่ได้รับการรักษา อาจ
มีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะในอนาคต ท่อปัสสาวะตีบ หรือถุงน้ำอาจเกิดขึ้นได้



ควรไม่ควร

- ✓ ควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับอาการของเด็ก
- ✓ ควรใช้ผ้าอ้อมสองชั้นหลังผ่าตัด หนึ่งในสำหรับอุจจาระและอีกชั้นสำหรับปัสสาวะจากท่อที่ใส่
- ✓ ควรรักษาบริเวณผ่าตัดให้แห้ง หากเป็นอุจจาระให้ล้างด้วยน้ำสะอาด
- ✓ ควรรีบแจ้งแพทย์หากหลังผ่าตัดมีหนอง เลือดออก ปัสสาวะไม่ได้ มากกว่า 1 ชม.
- ✓ ควรรีบพาเด็กไปห้องฉุกเฉินหากมีเลือดออกจากแผลผ่าตัดไม่หยุด



- ✗ ไม่ควรให้เด็กนั่งคร่อมของเล่นสีกระฉะ หากแพทย์ไม่ยินยอม
- ✗ ไม่ควรให้แผลถูกน้ำหากแพทย์ไม่อนุญาต
- ✗ ไม่ควรพยายามกดสายปัสสาวะเด็กเอง

