



Meconium stained

Equipment

1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

Proceduere

0	Assessment (มี meconium stained amniotic fluid การก้มหายใจ hypotonia HR 80)ประเมิน vigorous ได้ (ประเมิน 3 อย่างคือ การหายใจ tone heart rate)
1	Initial step of resuscitation keep warm ใต้ radian warmer จัด position ในท่า sniffing เลือก ET tube No.3.5 ใช้ meconium aspirator ได้ถูกต้อง เปิด suction pressure -80กึ่ง-100 mmHg
2	ประเมิน heart rate ใน 6 วินาที การหายใจ positive pressure ventilation (หลังทำ meconium Aspiration 1 ครั้งไม่ได้ชี้เทา HR 60, เขียว ไม่หายใจ
3	เช็ดตัวกระตุ้น จัด position ใหม่ ทำ PPV 30 วินาที face mask ขนาดถูกต้อง เลือก self inflating bag ถูกต้อง Room air resuscitation PPV technique ถูกต้อง (breath-two-three)
4	มี chest movement ประเมิน HR, respiration
5	HR,80/min,เขียว,ไม่หายใจ ทำ PPV ต่ออีก 30 วินาที Room air oxygen

