



เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นได้บ่อย มีผลกับชั้นพิวหนิง mesothelium เป็นชั้นที่คลุมและป้องกันอวัยวะภายใน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการที่ชั้น pleura เป็นเนื้อเยื่อรอบบริเวณปอดและตามแนวช่องอกหรือperitoneum แนวของช่องท้อง ส่วนใหญ่เกิดในชายมากกว่าหญิง และความเลี้ยวเพิ่มมากขึ้นตามอายุ



## สาเหตุ

จากการทำงานที่ใกล้ชิดกับสาร asbestos แต่ถึงแม้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารนี้ก็สามารถเป็นมะเร็งชนิดนี้ได้ เช่นจากการสูบบุหรี่ เป็นต้น

## อาการ

ปรากฏในช่วงอายุ 30-50ปี หลังจากได้รับสาร asbestos มีอาการ หายใจเร็วที่ แน่นหน้าอก หากรอยโรคอยู่ที่ท้อง มีอาการน้ำหนักลด ปวดท้อง ท้องบวม การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ชิด มีไข้ และสามารถแพร่กระจายไปส่วนอื่นของร่างกายได้ ปัญหาการกลืน หน้าและคอบวม

## วินิจฉัย

การวินิจฉัยอาการโรคนี้ค่อนข้างยากเพราะอาการคล้ายอาการป่วยทั่วไป นอกจากแพทย์ซักประวัติการได้รับสาร asbestos รวมถึงการตรวจร่างกาย เอกซเรย์ปอด ตรวจการทำงานของปอด CT MRI การเก็บชิ้นเนื้อเพื่อการยืนยันการวินิจฉัยจากการส่องกล้องเข้าไปตัดชิ้นเนื้อ และทำ thoracoscopy สำหรับรอยโรคที่อยู่ในปอดและ peritoneoscopy สำหรับรอยโรคอยู่ในท้อง



## การรักษา

ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรคหรือการแพร่กระจาย มะเร็ง Mesothelioma สามารถเกิดเป็นเฉพาะที่หรือแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง ปอด ช่องอก อวัยวะในช่องท้อง ใช้วิธีการการผ่าตัดเนื้อมะเร็งและเนื้อเยื่อรอบๆออก ฉายแสงโดยใช้รังสี

พลังงานสูงยิงเข้าไป การทำคีโมโดยการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำ เพื่อใช้ในการรักษา



## ควรไม่ควร

- ✓ ควรบอกอาการที่รู้สึกแก่แพทย์
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากแน่นหน้าอก ปวดท้อง กลืนลำบาก มีไข้
  - ✗ ไม่ควรสูบบุหรี่
  - ✗ ไม่ควรรับประทานนม
  - ✗ ไม่ควรแจ้งแพทย์หากมีอาการปวดโดยเฉพาะหลังผ่าตัด

