



ชักประวัติตาพร่ามัว (Blurred vision)

Equipment			
1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	
Procedure			
0	การปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วย แนะนำตนเองและถามชื่อ นามสกุล และแจ้งวัตถุประสงค์ แสดงภาษากายอย่างเหมาะสม (สบตา, สบใจ, พยักหน้า)		
1	ประวัติเกี่ยวกับตาพร่ามัว ตาพร่ามัวกับที่เห็นหรือตาพร่ามัวลวม เป็นมานานเท่าไร เหมือนมีหมอกหรือฝ้าขาวบัง ตาพร่ามัวโดยเฉพาะเวลามองแสงสว่าง		
2	มองเห็นแสงสีรุ้งรอบดวงไฟ (Rainbow halo) ตาพร่ามัวอ่านตัวหนังสือไม่ชัดหรือดูทีวีใกล้หรือไกลผิดปกติ		
3	ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตาและเมื่อยล้าตา ใช้แว่นสายตาหรือ contact lens ตาพร่ามัวเหมือนมีฉากกั้นหรือม่านบัง และภาพบิดเบี้ยว จุดดำหรือหยากไย่ลอยไปมา (floater) เห็นแสงวาบ (Flashing)		
4	ปวดตา ตาแดง คันเคืองตา มีขี้ตา น้ำตาไหล เลย์ติดหรืออักเสบตามาก่อน เคยตาพร่ามัวมาก่อน		
5	ประวัติอุบัติเหตุกระทบกระเทือนบริเวณตา หรือเคยเป็นแผลที่กระจกตา		
6	ประวัติเกี่ยวกับเบาหวานและโรคที่เกี่ยวข้อง ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะวันละกี่ครั้ง กลางวันกี่ครั้ง กลางคืนกี่ครั้ง		
7	หิวน้ำบ่อย กินจุ กินมาก น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน ชาปลายมือปลายเท้า ปัสสาวะเป็นฟองค้ำหรือ ปัสสาวะออกน้อย เจ็บแน่นหน้าอกร้าวไปแขนซ้าย นอนราบไม่ได้ สะดุ้งตื่นขึ้นมาหอบ เหนื่อยอ่อนแรง มุมปากตก		
8	โรคประจำตัวเช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไชมันโบลเลือดสูง โรคไต ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ต้อกระจกสายตาผิดปกติ		
9	ยาที่ใช้ประจำ เช่น steroid (ยาหม้อ, ยาต้ม, ยาชุด, ยาลูกกลอน) ethambutal digitalis chloroquine		
10	ประวัติแพ้ยา ประวัติครอบครัวเป็นโรค เช่น เบาหวาน ต้อหิน การวินิจฉัย diabetic retinopathy การวินิจฉัยแยกโรค Retinal detachment refractive error cataract		

