



ทักษะการตรวจจอตประสาทตาด้วย

Direct ophthalmoscope

Equipment

1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

Procedure

0	แนะนำตัวแล้วขออนุญาตผู้ป่วยเพื่อตรวจ สื่อสารกับผู้ป่วยเป็นระยะ ขณะทำการตรวจ
1	ตรวจด้วยความนุ่มนวลและสุภาพ เรียกชื่อ Direct ophthalmoscope ได้ถูกต้อง
2	เตรียมอุปกรณ์ได้ถูกต้อง ประกอบเครื่องมือกับด้ามจับ ปรับไฟตามขนาด Pupil ปรับกำลังค่าสายตาไปที่ศูนย์ หรือตามค่าสายตาของผู้ป่วยและผู้ตรวจ ปิดไฟห้องตรวจ
3	จัดระยะห่างประมาณ 2 ฟุต และทำผู้ป่วยนิ่งหล้อมกันโดยตาขวาผู้ตรวจตรงกับตาขวาผู้ป่วย
4	จับอุปกรณ์อย่างมั่นคง นิ้วโป้งสามารถเปิดปิดไฟ นิ้วชี้ปรับค่า ต่างๆได้ถูกต้อง
5	ส่องหา red reflex มองตาม red reflex จนเห็นจอตประสาท เก็บอุปกรณ์เข้าที่
6	อธิบายสิ่งที่ตรวจพบ blurred disc margin normal retinal vessel หรือ A/V ratio =2/3 normal macula
7	ตอบ Papilledema หรือ disc swelling ให้ ถ้าตอบ papillitis ให้ ถ้าตอบ other optic neuropathy ให้

