



ผู้ป่วยเด็กที่มาด้วยอาการซัด

Equipment			
1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	
Procedure			
0	แนะนำตัว ทำทการสุภาพ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพท์ทางการแพทย์		
1	ระยะเวลาที่มีซัด อาการแสดงของอาการซัด เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย น้ำหนักขึ้นน้อย		
2	อาการร่วม เช่น ไข้ จ้ำเลือดตามตัว ประวัติ ปัสสาวะสีดำ สีคัก ประวัติเสียเลือด เช่น อาเจียนเป็นเลือด/ถ่ายดำ/ อุจจาระมีเลือดปน		
3	ประวัติชนิดของอาหารที่รับประทานอาหาร ปริมาณอาหารที่มืออย่างละเอียดถามเน้นการบริโภคอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ตับ ไข่แดง เครื่องใน		
4	ประวัติโรคประจำตัว เช่น โรคราลัสซีเมีย/ G6PD deficiency ประวัติการคลอดและภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด เช่น ภาวะซัด/ภาวะตัวเหลือง		
5	ประวัติคนในครอบครัวมีอาการ ซัด/เหลือง เป็นๆหายๆ ตั้งแต่อายุน้อยๆ		
6	ประวัติโรคราลัสซีเมียในครอบครัว ประวัติการใช้ยาหรือสารบางชนิดก่อนมีอาการซัด เช่น ยากลุ่มซัลฟา/กั้วปาก อ้า		
7	ประวัติที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม เช่น อยู่ใกล้โรงงานตะกั่ว/เดินเท้าเปล่าซึ่งเสี่ยงต่อ hookworm		

