




อวัยวะชายหรืออวัยวะสร้างมากเนื้อเยื่อ corpus cavernosum และ corpus spongiosum เป็นอวัยวะที่ล่อเลี้ยงด้วยเลือดและการแข็งตัว ซึ่งในโรคที่เป็นโรคที่เกิดความผิดปกติในการแข็งตัวของอวัยวะ พบได้ประมาณ 1% ของผู้ชายอายุ 45-60 ปี ซึ่งไม่ใช่ภาวะที่อันตรายแต่เกี่ยวกับความมั่นใจและการแข็งตัวของอวัยวะเพศ




สาเหตุ

ไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน อาจพบเนื้อเยื่อผังริ้วอีกด้านหนึ่งของอวัยวะทำให้ไม่สามารถแข็งตัวได้เต็มที่ การได้รับบาดเจ็บอาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุ หรือการผ่าตัดก่อนหน้า ก่อให้เกิดเนื้อเยื่อผังริ้ว ไม่ติดต่อคนข้างเคียง



อาการ

ปวดเวลาแข็งตัว และอยู่ที่เนื้อเยื่อผังริ้วส่วนใดของอวัยวะจากงอไปด้านบนนั้นทำให้เหยียดไม่สุด อาการเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะเวลา 2 ปี อาการอื่น ๆ เช่น การสอดใส่ การแข็งตัวมีปัญหาขณะมีเพศสัมพันธ์ เจ็บเวลาแข็งตัว หรือตัวอวัยวะสั้นกว่าปกติ



วินิจฉัย

จากการซักประวัติตรวจร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะ ตรวจเลือด ดูอัลตราซาวด์หาสาเหตุ

การรักษา

อาการเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องรักษา หากมีอาการรุนแรงส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การรักษาด้วยยา จำทำให้องคชาตแข็งตัวได้ ร่ายขึ้นหรือวิธี vacuum ทำให้เลือดที่มาเลี้ยงองคชาตล่อเลี้ยงได้ บานทำให้แข็งนานขึ้น หรือหากรุนแรงมากอาจต้องผ่าตัดนำ เนื้อเยื่อตัวรังออก การมีเพศสัมพันธ์ได้หลังจากผ่าตัดไป 6 สัปดาห์



ควรไม่ควร

- ✓ ควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับอาการอื่น ๆ ที่พบ
- ✓ ควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาที่กินอยู่เป็นประจำ
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากการแข็งตัวแยลง
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หลังการผ่าตัดหากมีไข้หรือมีกลิ่นเหม็น



✗ ไม่ควรเปลี่ยนปริมาณยาที่กินหากแพทย์ไม่ได้สั่ง

