



ตั้งแต่เกิดหนังหุ้มอวัยวะรัดแแกนองคชาตมากเกินไป ประมาณ 1-2ปีแรกจะค่อยๆคลายตัว ภาวะหนังหุ้มปลายองคชาตตีบเกิดจากการอักเสบบวมแดงของ พิวหนังเกิดเมื่อน้ำหุ้มรัดแน่น เกิดในเด็กเล็กหรือวัยรุ่นหรือเกิดจากการติดเชื้อหรือระคายเคือง และสามารถเกิดในชายที่เป็นเบาหวานหากมีใส่สายสวนปัสสาวะ Paraphimosis เกิดขึ้นขณะที่เปิดหนังหุ้มองคชาตแล้วไม่สามารถดึงกลับได้ เกิดขึ้นได้ในขณะ มีเพศสัมพันธ์หรือขณะทำความสะอาด อาการเหล่านี้เกิดได้ทุกช่วงอายุแต่เกิดบ่อยในการกและวัยรุ่น



สาเหตุ

ภาวะหนังหุ้มปลายองคชาตตีบเกิดเป็นระยะเวลาาน การอักเสบเรื้อรัง บริเวณปลายขององคชาต



อาการ

phimosis มีปัญหาการปัสสาวะ หรือการดึงกลับของเยื่อหุ้มปลาย ติดเชื่อบ่อย ๆ หรือปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ paraphimosis ไม่สามารถดึงพิวหนังกลับมาหุ้มปลายปูดบวมบริเวณองคชาต

วินิจฉัย

จากการตรวจร่างกาย และส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทาง ศัลยกรรมท่อปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย



การรักษา

Phimosis เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ แต่อาการดีขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องรักษา หรือใช้ครีมทาเพื่อให้รูดหนังหุ้มได้ ง่ายขึ้น หากไม่ดีขึ้นจำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อกรีดบริเวณหนัง หุ้มปลาย Paraphimosis เป็นภาวะเร่งด่วนต้องรับรักษาโดยการกรีดเล็กบริเวณ พิวหนังองคชาต



ควรไม่ควร

- ✓ ควรรู้จักวิธีทำความสะอาดหากมีภาวะหนังหุ้มปลายองคชาตตีบ
- ✓ ควรรีบบอกแพทย์หากเป็นเบาหวาน เมื่อใส่ท่ออาจเกิดแผลทำให้ติดเชื้อง่าย
- ✓ ควรแน่ใจว่าหลังจากใส่ท่อปัสสาวะแล้วรูดหนังหุ้มปลายมา ปิดเรียบร้อย
- ✓ ควรให้แพทย์รักษาหากพบว่ารูดหนังหุ้มปลายมาปิดไม่ได้



✗ ไม่ควรรักษาด้วยตัวเอง

✗ ไม่ควรใช้ยาอื่นทาบริเวณที่หนังหุ้มปลายบีบรัด

