



Slab (Fx. Clavicle)

Equipment

1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

Procedure

0	การปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วย แนะนำตัวเองกับผู้ป่วย สอบถามชื่อผู้ป่วย บอกวิธีการรักษา และขออนุญาตทำการรักษา สื่อสารกับผู้ป่วยเป็นระยะ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยสุภาพและนุ่มนวล
1	ช่วยพยุงผู้ป่วยให้ลุกจากท่านอน ให้ผู้ป่วยนั่งบนเตียงหรือเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิง
2	จัดท่าผู้ป่วยเอนออกไปทางด้านหน้า มือ 2 ข้างท้าวสะเอว ช่วยพยุงแขนขวาของผู้ป่วยหรือ สอนให้ผู้ป่วยใช้มือซ้าย จับมือขวาไปจับที่เอว
3	เลือก clavicular splint ขนาดที่เหมาะสม
4	แกะสายทึง 2 ด้านของ splint วางแผ่นรองหลังรูปสามเหลี่ยม ไว้ ด้านหลังของผู้ป่วยหันด้านเรียบเข้าชิดพิงผนัง ด้านมีห่วงอยู่ด้านนอก
5	คล้องสายส่วนที่เป็นฟองน้ำผ่านไปทางด้านหน้าบริเวณกระดูก สันไหปลาร้าและสอดผ่านใต้รักแร้
6	สอดสายเข้าในห่วงทึง 2 ข้างปรับความยาวให้สมดุล ดึงรั้งให้ตึง และติดตีนตุ๊กแกเข้าด้วยกัน
7	ภาวะแทรกซ้อนและระยะเวลาการรักษา บัญหาแผลกดทับ อาการชา อาการบวมของแขน

