




เกิดอาการปวดทันทีเมื่ออัณฑะบิดขั้วบริเวณส่วนปลายของหลอดอสุจิซึ่งประกอบไปด้วยเลือดที่เลี้ยงอัณฑะ และเมื่อเกิดการบิดขั้วเลือดจะไม่สามารถมาเลี้ยงอัณฑะทำให้ขาดเลือดและเซลล์ตายได้ อัณฑะบิดขั้วเกิดในชายอายุ 12-20ปี และเด็กทารก เป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรักษา



สาเหตุ

ก่อนเกิด อัณฑะสร้างและพัฒนาในขณะที่ยังขั้วอัณฑะเคลื่อนลงมาในถุง อัณฑะติดกับผนังช่องท้องโดยหลอดนำอสุจิบางครั้ง เนื้อเยื่อเหล่านี้หย่อนยานทำให้เกิดการบิดขั้วได้ง่าย



อาการ

มีอาการปวดบริเวณอัณฑะทันทีพร้อมกับอาจจะมีปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนด้วย อัณฑะจะบวมและกดเจ็บและถูกดึงกลับในช่องท้อง

วินิจฉัย

จากการซักประวัติตรวจร่างกาย อัลตราซาวด์ตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยและตัดโรคอื่น ๆ ออกไป ซึ่งจะแสดงการที่เลือดเข้ามาเลี้ยงอัณฑะ



การรักษา

ต้องรักษาทันทีเพื่อป้องกันการทำลายอวัยวะ โดยแก้ไขบริเวณที่บิดขี้และจัดตำแหน่งที่เดิม หากไม่รักษาภายใน 4-6ชม.หลังปวด เนื้ออวัยวะอาจตายหมด และอาจต้องตัดทิ้ง หลังจากผ่าตัด ให้พักผ่อน ใส่ชุดพยุงอวัยวะ หลีกเลี่ยงการยกของหนัก เล่นกีฬา



ควรไม่ควร

- ✓ ควรรีบรับการรักษาหากมีการปวดบวมที่อวัยวะหลังจากผ่าตัดแล้ว เพราะอวัยวะสามารถบิดขี้ซ้ำอีกได้
- ✓ ควรบอกแพทย์หากพบก้อนแข็งๆของอวัยวะ
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากมีไข้ เลือดออก หรือปวดหลังผ่าตัด



- ✗ ไม่ควรละเลยอาการปวดหรืออายุที่จะพบแพทย์ ควรรีบรักษาก่อนอวัยวะจะขาดเลือด
- ✗ ไม่ควรพลาดนัดพบแพทย์ ศัลยกรรมกระเพาะปัสสาวะ
- ✗ ไม่ควรเข้าใจผิดการตัดอวัยวะหนึ่งข้างไม่มีผลต่อการแข็งตัว หรือการมีบุตร

