



เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเล็กและกลางของขา
และแขน การอักเสบขึ้นอยู่กับแผลเป็นและการอุดตัน
ของเส้นเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้น
น้อย เกิดในผู้ชายอายุน้อยกว่า 50 ปีที่ติดบุหรี่



สาเหตุ

พบเฉพาะในคนสูบบุหรี่ ยิ่งสูบบุหรี่ยิ่งแย่ ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ส่งต่อทางพันธุกรรม

อาการ

เริ่มที่มือและเท้า จะรู้สึกชาและเย็น อวดกล้ามเนื้ออ่อนแอ แผลบน
ผิวหนังเกิดจากออกซิเจนไปเลี้ยงน้อย แผลเกิดบนปลายนิ้วเท้า
นิ้วมือ เนื้อเยื่อกลายเป็นเนื้อตายและอาจจำเป็นต้องตัด



วินิจฉัย

ซักประวัติตรวจร่างกาย เกิดเป็นลิ่มเลือดเล็กไปอุดตันตามเส้น
เลือด Angiograph ช่วยในการวินิจฉัย Echo ช่วยยืนยันว่าไม่มีลิ่มเลือดอยู่ใน
หัวใจและวิ่งไปตามขา

การรักษา

การรักษาที่ดีที่สุดคือการหยุดสูบบุหรี่ หากสูบบุหรี่จะทำให้
อาการแย่ลง เกิดแผลที่ผิวหนัง ขาดเลือดจนต้องตัดเนื้อร้าย
ออกไป การรักษา อาจทำบายพาส และตัดเอาส่วนเส้นประสาทที่
เสียออก ยาอาจใช้เพื่อขยายหลอดเลือด



ควรไม่ควร

- ✓ ควรเข้าใจว่าเป้าหมายของการรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดจากระบบหมุนเวียนเลือดไม่ดี และรักษาแผลที่เกิดขึ้น
- ✓ ควรทราบว่าการทำบายพาสเลือดที่อุดตันยิ่งทำให้แผลหายเร็ว
- ✓ ควรป้องกันนิ้วมือนิ้วเท้าจากอากาศเย็นและการบาดเจ็บ
- ✓ ควรรีบพบแพทย์หากมีอาการปวดบวมกระตั้นหับขณะเดินหรือพัก รอยแตกของแผล เทา มือ



✗ ห้ามสูบบุหรี่

✗ ห้ามพลาดนัดหมอ ต้องตามดูแผลและให้ยาปฏิชีวนะ

