




อัณฑะไม่ลงถุง เกิดจากลูกอัณฑะไม่สามารถลงไปถุงอัณฑะได้ ในในขณะที่ยังอยู่ในครรภ์ซึ่งปกติแล้วลูกอัณฑะเนี่ยจะเคลื่อนตัวลงมาอยู่ในช่องท้องและก็ลงสู่ถุงอัณฑะใช้เวลาช่วงสั้นๆก่อนที่เด็กจะคลอดซึ่งภาวะนี้เกิดได้ 3% ของเด็กที่อายุครรภ์ครบกำหนดและ 30% เกิดได้ในเด็กที่คลอดก่อนกำหนด



สาเหตุ

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดบางทีอาจจะเกิดจากฮอร์โมนของแม่ที่หลั่งออกมาไม่เพียงพอ หรือการพัฒนาการของตัวอัณฑะที่แย่ง ในบางทีอาจจะเกิดจากการอุดตันทางผ่านที่ลงของลูกอัณฑะหรือแม่อาจจะกินยาฮอร์โมนบางอย่างขณะตั้งครรภ์ทำให้มีผลต่อการการเคลื่อนตัวของลูกอัณฑะลงมาในถุงอัณฑะ




อาการ

จะเห็นและสัมผัสได้ว่าลูกอัณฑะไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยที่เด็กไม่ได้มีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย

วินิจฉัย

แพทย์ตรวจร่างกายเด็กทารกแรกเกิดซึ่งกว่า 80% แม่จะคำที่บริเวณ Inguinal canal ซึ่งเป็นทางผ่านลงมาทางช่องท้องด้านล่างอาการไม่พบแม่จะนำอัลตราซาวด์มาตรวจดูอีกครั้งหนึ่งหากใช้อัลตราซาวด์แล้วยังไม่เจอตัวลูกอัณฑะ จะใช้วิธีการทำ CT Scan เพื่อหาตำแหน่งของลูกอัณฑะหรือบางทีจำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านหน้าท้อง



รักษา

แล้วปกติแล้วลูกอืดทะจะลงมาในอุจจาระได้เองโดยไม่จำเป็นต้องรักษา หากรู้ปัญหาไม่ลงหมายถึงอืดทะจำเป็นต้องทำ การพ่นตัดอืดทะไม่ลงมาอยู่ในอุจจาระไม่ได้ทำการรักษา อาจจะมีผลต่อการผลิตสเปิร์มในอนาคตแล้วผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องลูกอืดทะไม่ลงไปในตัวไม่ว่าจะรักษาด้วยการพ่นตัดหรือไม่ก็ตามยังมีภาวะความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลูกอืดทะมากขึ้น



ควรทำไม่ควรทำ

- ✓ ควรมาตามนัดแพทย์นัดตรวจร่างกาย
- ✓ ควรแจ้งแพทย์ทราบหากเด็กทารกมีอาการปวด



✗ ไม่ควรกังวลมากเกินไปโดยปกติแล้วอืดทะจะลงมาในอุจจาระได้เองโดยไม่จำเป็นต้องรักษา

