




Varicocele หลอดเลือดอวัยวะชาย

เกิดจากหลอดเลือดดำบริเวณถุงอัณฑะขยายขนาดขึ้น ซึ่งถุงอัณฑะเป็นถุงที่ห้อยต่ำ ลงมาจากองคชาติ และเป็นที่อยู่ของอัณฑะและเส้นเลือดดำจะนำเนื้อเสียจากเนื้อเยื่อและเซลล์จะกลับเข้าสู่หัวใจถุงอัณฑะจะมี 2 ข้างซ้ายและขวาซึ่งหลอดเลือดอวัยวะชายสามารถเกิดได้ทั้งสองข้างแต่ส่วนใหญ่จะพบว่าข้างซ้ายเป็นส่วนมากเพราะแรงดันทางดำขั้วจะมากกว่านั้นข้างขวาหลอดเลือดอวัยวะชายเป็นผลทำให้ถุงอัณฑะมีขนาดใหญ่ขึ้นได้ หลอดเลือดอวัยวะชายเกิดได้ 15 เปอร์เซ็นต์ของในจำนวนผู้ชายทั้งหมดพบได้บ่อยในเด็กโตและวัยทำงาน ซึ่งเป็น 20% ของผู้ชายที่เป็นหมันมีหลอดเลือดอวัยวะชาย



สาเหตุ

โดยปกติแล้วหลอดเลือดดำจะมีลิ้นเปิดปิดเพื่อไล่เลือดกับศูนย์หัวใจ หากลิ้นเปิดปิดหลอดเลือดนี้ไม่ทำงานหรือทำงานไม่ดีจะส่งผลให้เลือดย้อนกลับแล้วก่อให้เกิดการขยายของหลอดเลือดดำและเป็นเลือดขดในที่สุด



อาการ

อวัยวะชายไม่มีอาการใด ๆ อวัยวะชายจะพบโดยบังเอิญจากการตรวจร่างกายของแพทย์แต่ในบางรายอาจมีอาการถุงอัณฑะมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ไม่เจ็บ อาจจะมีรู้สึกหน่วงหน่วงบริเวณถุงอัณฑะพบเส้นเลือดบนถุงอัณฑะเป็นลักษณะคล้ายตัวหนอนเกิดจากการขยายตัวของเส้นเลือดดำนั่นเอง



วินิจฉัย

ราคาตรวจร่างกายที่บริเวณถุงอัณฑะหากผลการตรวจไม่แน่ชัด อาจทำการอัลตราซาวด์เพื่อดูพยาธิสภาพภายในของหลอด เลือดบริเวณถุงอัณฑะนำหาสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้ถุงอัณฑะบวม ขึ้น



การรักษา

ไม่จำเป็นต้องรักษาหากไม่มีอาการปวดหรืออาการฟุ้งของลูกอัณฑะมีปัญหาในเรื่องของการสืบพันธุ์หากจำเป็นต้องผ่าตัดและการผ่าตัดนี้ว่า varicocelectomy.คือการผ่าตัดเอาเส้นเลือดที่มีปัญหาที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดออกทำให้เลือดไปเลี้ยงถุงอัณฑะได้ดีขึ้นซึ่งการผ่าตัดนี้ทำโดยศัลยแพทย์ทางท่อน้ำอสุจิจะจำเป็นต้องพัก าน 7 วันกว่า 15% สามารถเกิดขึ้นซ้ำอีกและการผ่าตัดก็สามารถทำได้ครั้งเช่นกัน

ควรทำไม่ควรทำ

- ✓ ควรสวมที่ช่วยพยุงหากมีเส้นเลือดอัณฑะขนาดใหญ่มาก
- ✓ ควรรีบแจ้งแพทย์หากมีอาการปวดปกติ
- ✓ ควรรีบแจ้งแพทย์หากมีปัญหาเรื่องการสืบพันธุ์

✗ ไม่ควรละเลยอาการปวดบวมบริเวณถุงอัณฑะ

