



ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายอยู่ตำแหน่งหน้าลำไส้ตรงอยู่ใต้ต่อกระเพาะปัสสาวะที่สำหรับเก็บปัสสาวะ ต่อมลูกหมากอยู่ล้อมรอบท่อปัสสาวะ การที่ต่อมลูกหมากอักเสบจะมีอาการบวมปวดและปัสสาวะยากกว่า 50% ของผู้ชายมีปัญหาในเรื่องของโรคต่อมลูกหมากอักเสบเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต การอักเสบแบบเฉียบพลันอาจจะเจอบ่อยกว่าการอักเสบแบบเรื้อรังจะพบในชายวัยกลางคนเป็นจำนวนมาก



สาเหตุ

เชื้อแบคทีเรียสาเหตุทำให้เกิดการอักเสบแบบเฉียบพลันและเรื้อรังซึ่งนำไปสู่การติดเชื้อย้อนกลับที่ท่อปัสสาวะต่อมลูกหมากอักเสบยังเป็นผลมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ chlamydia และ mycoplasma หรือสารเคมี หากมีอาการกลัมน้ำหนักหรือเจ็บหน้าจะทำให้ปวดบริเวณอุ้งเชิงกรานได้



อาการ

มีไข้หนาวสั่นแสบขัดเวลาปัสสาวะปัสสาวะมากกว่าปกติปวดที่หลังด้านล่างหรือบริเวณองคชาติได้ข้างบนบางครั้งมีอาการรุนแรงเกิดขึ้นในทันทีทันใดส่วนต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังจากแบคทีเรียไม่ค่อยมีอาการอะไรแต่อาจจะมีเลือดปนมากับปัสสาวะมีปัสสาวะเล็ดหรือการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะได้



วินิจฉัย

แพทย์จะทำการตรวจทางทวารหนักโดยสอดนิ้วเข้าไปทางรูทวารเพื่อตรวจขนาดและลักษณะของต่อมลูกหมากวันนี้อาการกดเจ็บที่ต่อมลูกหมากทำไม่ถึงการเกิดต่อมลูกหมากอักเสบได้หากมีขนาดใหญ่ขึ้นมักจะพบใน

ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง แพทย์จะทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะและน้ำจากต่อม
ลูกหมากและเจาะเลือดเพื่อตรวจหาอาการติดเชื้อ

การรักษา

ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการต่อม
ลูกหมากอักเสบเวลา 14 วันและ 4
สัปดาห์สำหรับบุคคลที่เป็นเรื้อรัง



อาการรุนแรงมาก สัปดาห์อาการรุนแรงมากจำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือด
ต่อมลูกหมากอักเสบที่ไม่ได้เกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรียอาจจะให้เป็นยาบรรเทา
อาการอักเสบเช่นไอบูโพรเฟนหรือยาลดอาการปวดทั่วไป

ควรไม่ควร

- ✓ ควรหยุดกินยาปฏิชีวนะหากแค่แนะนำให้หยุดยา
- ✓ ควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาที่กินประจำ
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากรู้สึกปวดแสบขัดเมื่อปัสสาวะหรือมีเลือดออกปนกับปัสสาวะ
ฉันทแจ้งแพทย์หากมีอาการไข้หนาวสั่นเหงื่อออก
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากมีอาการฉี่แสบฉี่บ่อยกลางคืน



- ✗ ไม่ควรปั่นจักรยานหรือทำกิจกรรมที่กระแทกตัวต่อม
ลูกหมาก
- ✗ ไม่ควรกินอาหารหรือดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลให้
อาการแย่ลง