



การทำคลอดศีรษะทารก

| Equipment | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 1 | | 8 | |
| 2 | | 9 | |
| 3 | | 10 | |
| 4 | | 11 | |
| 5 | | 12 | |
| 6 | | 13 | |
| 7 | | 14 | |
| Procedure | | | |
| 0 | แนะนำตนเอง แจ้งวัตถุประสงค์การทำหัตถการแก่ผู้ป่วยให้ทราบ ทำหัตถการด้วยความนุ่มนวล ปฏิบัติด้วยวิธี sterile technique ในทุกขั้นตอน | | |
| 1 | เตรียมความพร้อม การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทำคลอด | | |
| 2 | ขั้นตอนปฏิบัติ การฉีดยาเฉพาะที่ ในแนวที่จะตัดฝีเย็บ การตัดฝีเย็บ ตัดฝีเย็บแบบ mediolateral ตามแนวที่ฉีดยาชาโดยนิ้วมือข้างหนึ่งเข้าไประหว่างฝีเย็บกับศีรษะทารกเพื่อป้องกันเกิดบาดแผลต่อทารก | | |
| 3 | การทำคลอดศีรษะทารก มายืนอยู่ที่ symphysis pubis จึงทำการ save perineum มือที่ save perineum รูดฝีเย็บให้ผ่านหน้าและคางทารกแล้วหมุนหน้าทารกให้หงายขึ้น | | |
| 4 | ใช้ลูกยางดูดเมือกและน้ำคร่ำในปากทารก ใช้สำลีชุบน้ำเกลือเช็ดตาทารกทั้ง2ข้าง | | |
| 5 | การทำคลอดไหล่ จับศีรษะทารกด้วยมือทั้งสองข้าง โดยนิ้วหัวแม่มือทาบไปตามกระดูก Frontal นิ้วชี้ทาบไปตามกระดูก Mandible และอีกสามนิ้วที่เหลือทาบไปตามท้ายทอยทารก | | |
| 6 | ทำคลอดไหล่หน้า โดยดึงศีรษะทารกลงจนกระทั่งเห็นไหล่หน้าจนถึงบริเวณซอกรักแร้ที่อยู่ใต้ symphysis pubis จึงหยุด | | |
| 7 | แล้วจึงทำคลอดไหล่หลังโดยยกศีรษะทารกขึ้นไปทางหน้าทอมารดาให้ไหล่หลังคลอดออกมาแล้วลดศีรษะทารกลงให้ไหล่ทั้งสองคลอดออกมา | | |

