




ถุงน้ำต่อมบาร์โธลิน

BARTHOLIN CYST

ต่อมบาร์โธลินอักเสบมีลักษณะบวมเป็นถุงของมาเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้บริเวณด้านข้างของปากช่องคลอด เกิดขึ้นได้เมื่อเกิดการอุดตันบริเวณต่อเมื่อ ซึ่งจะไม่ติดเชื้อถึงแม้ไม่ได้รับการรักษา

สาเหตุ

ulatoryครั้งที่ ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ซึ่งแบคทีเรียหลายชนิดสามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อและขยายขนาดของถุงน้ำ และเกิดได้ในเพศหญิงทุกคน อย่างไรก็ตาม หญิงตั้งครรภ์ หรือมีเบาหวาน ยังทำให้เกิดถุงน้ำบ่อยขึ้น ถุงน้ำเกิดการติดเชื้อได้ในผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์



อาการ

อาการหลักคือ จะบวมเป็นถุงน้ำบริเวณใกล้ปากช่องคลอด แต่ไม่เจ็บ แต่หากมีการติดเชื้อจะทำให้มีอาการปวดได้ซึ่งทำให้เดินลำบากและเจ็บตอนมีเพศสัมพันธ์




วินิจฉัย

แพทย์จะตรวจบริเวณรอบปากมดลูกในตำแหน่งที่บวม อาจจะใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างเมื่อต้องมีการติดเชื้อ และตรวจเลือดในเรื่องของมีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ และแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางด้านบริเวณรักษาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

รักษา

ถ้าเป็นถุงน้ำเล็กสามารถหายเองได้ แพทย์จะนัดติดตามอาการทุก 2-3 เดือนเมื่อต่อมขนาดไม่เล็กลงหรือมีอาการหายลง ซึ่งถุงน้ำที่มีการอักเสบสามารถรักษาโดยแซะร่องน้ำร้อน หรือให้ยาปฏิชีวนะ จุดสำคัญตามนัด แพทย์และกินยาตามที่แพทย์สั่ง ถ้ายังอาการไม่ดีขึ้น จะส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านบริเวณรักษาโดยแพทย์เพื่อเวลาของออก ซึ่งมีการผ่าตัดและเย็บถุงน้ำเล็ก และเย็บรับบริเวณที่เกิด ถ้าจะทำให้ถุงน้ำหบวงให้ลอกออกมาได้เอง ถ้าผู้ป่วยมีการอักเสบบ่อยครั้ง จำเป็นต้องผ่าตัดบำบัดเวลาต่อเมื่อบาร์โธลินอักเสบ



គរិន់គរ

- ✓ គរិន់គរីទីរំលែកដឹងប៉ូលុយីនការត្រួតពិនិត្យសាខាតម្លៃជាមួយអាជីវកម្ម
- ✓ គរិន់គរីស្ថាប់ការរៀបចំការងារ និងការបង្កើតដែលសម្រាប់ជាអង់ភាព



- 🚫 ការិន់គរីដែលបានរៀបចំឡើងដោយបានចាន់ចាត់ឡើង។
- 🚫 ការិន់គរីដែលបានរៀបចំឡើងដោយបានចាន់ចាត់ឡើង។