



ກ້ອງພຸດ

ເກີດຈາກລຳໄສ້ເຄລື່ອນຕົວນ້ອຍກວ່າປົກຕົງ ໃນໆສາມາດດຽບໃຫ້ແນ່ນອນວ່າລຳໄສ້ຈະເຄລື່ອນຕົວປະມາດນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກົດຈາກດີ່ນ້ຳນ້ອຍ ບາງຄນເຄລື່ອນຕົວວັນລະສານຄຮັງ ບາງຄນສາມວັນເຄລື່ອນຕົວໜຶ່ງຄຮັງ ແຕ່ໜ້າກນີ້ມີເຄລື່ອນຕົວຂອງລຳໄສ້ກ່າວີ່ພິດໄປ ຄວາມດີ່ນ້ຳ

ຮັບອັນດຸກຫະວຸງຈາກຮ່າທີ່ປັບປຸງໄປຕ້ອງສູງສ້າຍເກີ່ຍົກກັບນະເຮົ້ງລຳໄສ້



ສາເຫຼຸດ

ກ້ອງພຸດເກີດຈາກການເຄລື່ອນຕົວຂ້າຂອງລຳໄສ້
ສາເຫຼຸດເກີດຈາກດີ່ນ້ຳນ້ອຍ ຮັບອັນດຸກຫະວຸງຈາກກົດຈາກໃຍນ້ອຍ
ຂັບຕົວນ້ອຍ ຕັ້ງຄຣກໍ ເດັນກາງເກີ່ຍົກຕ່າງກ່າວ
ຄວາມເຄີຍດີ່ ຮັບອັນດຸກຫະວຸງຈາກ

ລຳໄສ້ຈຸດຕັນເນື່ອງຈາກ ນະເຮົ້ງລຳໄສ້ ດ້ວຍຢາກເນື່ອງຈາກ
ການໃຫ້ຊີວິດພິດປົກຕົງໄປ ຍາຈຳພວກບຣໂກາຈາກ ຍາກລ່ວມປະສາກ
ຍາຕ້ານວາກາຮແພ້ ຍາຕ້ານເສົ້າ ຮັບອັນດຸກຫະວຸງຈາກ



ອາການ

ອຸຈາຣະແຂັງແລະແໜ້ງ ປວດກ້ອງ ແລະບວນ
ມີເລືອດວອກຂະບະເບ່ງອຸຈາຣະ ຮູ້ສຶກລຳໄສ້ເຄລື່ອນກໍ່ຕລວດເວລາ

ວົນຈັດຍ

ວົນຈັດຍຈາກການຊັກປະວັດຕິກາຣັກຫາຮວມດຶງການໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນທີປັບປຸງໄປ
ເຊັ່ນຄວາມເຄີຍດີ່ ການເດັນກາງ ການດື່ມນ້ຳ
ຍາກໍ່ກົດປະຈຳ ແລະຕຽບຈຸດກ້ອງ
ຮ່ວມກັບຕຽບກວາຮ້ານັກ ເກີ່ຍົກຮັດສັດວັງກວາຮ
ແລະຫຼູດກວາຮ້ານັກເປັນແພລ



ดูลักษณะของอุจจาระและสิ่งอุจจาระหาวว่ามีเลือดปนออกมานหรือไม่ หากมีเลือดปนจริง พูดป่วยต้องส่องกล้องเพื่อหาสาเหตุ และตรวจเลือดหาความเข้มข้นของเลือด หากส่องกล้องพบ ควรทำ CT scan ก้อนและอุ้งเชิงกรานต่อไป

การรักษา

เปลี่ยนการใช้ชีวิตด้วยการออกกำลัง กินน้ำเย็นๆอย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน




ยาด่ายังไม่จำเป็นต้องใช้ หากปรับการใช้ชีวิตแล้วไม่ดีขึ้น ให้กินยาด่ายาจากธรรมชาติ เช่น น้ำลูกพุน ขับด่ายาให้เป็นเวลา หรือดื่มน้ำฟทธ์น้ำอุ่นเพื่อช่วยกระตุบลำไส้ สำหรับคนที่ด่ายากปานกลางถึงรุนแรง ใช้ยาที่ช่วยให้อุจจาระนีมขึ้น หรือสวนกิจการหากจำเป็น



ควรไม่ควร

- ✓ ควรเจ็บแพกย์ถึงยาด่ายากที่พูดป่วยใช้ประจำ
- ✓ ควรกินอาหารที่มีการใหญ่
- ✓ ควรกินน้ำให้เพียงพอต่อร่างกาย
- ✓ ควรหลีกเลี่ยงยาต่อต้านสารก่อภูมิแพ้ซึ่งเป็นเหตุของก้อนพุก
- ✓ ควรพบแพทย์หากทำทุกวิธีแล้วไม่ดีขึ้น
- ✓ ควรพบแพทย์กันที่เบื้องมือข้า



- ✗ ไม่ควรใช้ยาด่ายาเป็นประจำ
- ✗ ไม่ควรสวนล้างลำไส้บ่อย
- ✗ ไม่ควรเพิกเฉยต่อการก้อนพุก เพราะอาจเป็นสาเหตุของการอื้นๆ