

เกิดจากไวรัสชื่อ rabies virus ด้รับเชื้อจากการถูกสัตว์กัด ซึ่งเชื้ออาศัยอยู่ในสัตว์จำพวก หมูป่า สก๊ิง แรคคูน ค้างคาว สุนัขจิ้งจอก ซึ่งสัตว์เลี้ยงในบ้านก็มีสิทธิ์ที่ด้รับเชื่อนี้



## สาเหตุ

เกิดจากการติดเชื้อ rhabdovirus ในน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อ



## อาการ

หลังจากติดเชื้อประมาณ 35-65 วัน จะเริ่มมีไข้ ปวดหัว รู้สึกแหย่ๆ ไม่อยากอาหาร คลื่นไส้ ปวดและชาบริเวณที่โดนกัดประมาณ 3-4 วันแรกหลังเริ่มมีอาการ หลังจากนั้นเริ่มมีอาการหวาดระแวง ไม่ยอมนอน ตื่นตัวตลอดเวลา มีอาการแปลกประหลาด กลัวแสง หากไม่รับรักษา ทำให้โคม่า ชัก และตายได้ ประมาณ 4-7 วันหลังเริ่มมีอาการ




## วินิจฉัย

ดูบริเวณบาดแผล และตรวจเลือด และสัตว์ที่กัดต้องถูกจับและตรวจเชื้อ rabie virus

## รักษา

หลังโดนกัดควรฟอกแผลด้วยน้ำสบู่ทันทีและรีบมาห้วง  
ฉุกเฉินเพื่อใช้ประวัติเพื่อล้างแผลอีกรอบ ส่วนการรักษาขึ้นกับ  
ความเสี่ยว่าจะติดเชื้อหรือไม่ และต้องกลับไปสังเกตสุนัขหรือ  
แมว10วันว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ ถ้าไม่ผิดปกติ แสดงว่า  
สัตว์ไม่มีเชื้อ สำหรับสัตว์ที่มีอาการติดเชื้อ แพทย์จะรับ  
ให้HRI6หรือHDCV ฉีดที่บริเวณรอบๆแผลทันที ส่วนHDCV  
ให้ ห้าครั้ง เริ่มที่วันที่ 0,3,7,14,28ควรมาฉีดให้ต่อเนื่อง และฉีดบาดทะยักเพื่อกระตุ้น  
ภูมิคุ้มกันอีกหนึ่งเข็ม



## ควรไม่ควร

- ✓ ควรบอกลักษณะอาการของสัตว์ที่กัด เพื่อที่จะช่วย  
พิจารณาในการรักษา
- ✓ ควรทราบว่าหลังจากสุนัขหรือแมวกัด ควรขังแยก  
เพื่อสังเกตพฤติกรรม 10 วัน
- ✓ ควรทราบว่าหากสุนัขมีอาการดุร้าย อ่อนแรง และตื่นตัวตลอดเวลา ถือว่ามีความ  
เสี่ยในการได้รับเชื้อ
- ✓ ควรรีบไปห้วงฉุกเฉินทันทีที่ใกล้บ้านเมื่อโดนสัตว์กัด



✗ ไม่ควรลืมน้ำอาการสุนัขที่ดุร้าย หรือพฤติกรรมที่แปลกไป  
น้ำลายยืด อ่อนเพลีย สามารถทำลายข้าว  
ของและกัดบุคคลรอบๆตัวได้เสมอ

