




ภาวะติดเชื้อทางช่องคลอด BACTERIAL VAGINAL INFECTION

เกิดจากที่เชื้อแบคทีเรียประจำถิ่นเพิ่มจำนวนมากขึ้น หรือ มีแบคทีเรียแปลกปลอมเข้ามาอยู่ เป็นผลให้เกิดการระคายเคือง อักเสบ บวม มีกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผลให้แบคทีเรียประจำถิ่นในช่องคลอดถูกรบกวนและเพิ่มจำนวนแบ่งตัวออกเป็นหลายชนิด นี่เป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อทางช่องคลอด ท่อปัสสาวะ เป็ดสุ่กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งกระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศอาจจะติดเชื้อร่วมด้วย การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากมีลูก แต่อย่างไรก็ตามก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัย

สาเหตุ

สาเหตุที่เกิดความไม่สมดุลของแบคทีเรียประจำถิ่นยังไม่ทราบแน่ชัด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดคือ เปลี่ยนคู่นอนบ่อย สวนล้างช่องคลอดเป็นประจำ อาบน้ำอุ่นหมักมีสบู่เกินไป ไม่รักษาความสะอาด อย่างไรก็ตาม แม้ผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถติดเชื้อได้ ความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อคุณเป็นเบาหวานหรือโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งอาจจะได้รับมาจากห้องน้ำสาธารณะ หรือสระว่ายน้ำรวม




A strong fishy odor (often worse after sex) and increased vaginal secretions may be the first or only symptoms. Many women have no symptoms.

อาการ

จะมีกลิ่นเหม็นปลาเน่า หลังจาก มีเพศสัมพันธ์ หรือมีสารคัดหลั่งอาจจะใสหรือขุ่นๆออกมาจากช่องคลอดมากขึ้น รู้สึกแสบบริเวณรูปัสสาวะเวลาปัสสาวะ คันรอบๆช่องคลอด ร่วมกับมีอาการสบวมแดงและปวดเวลามีเพศสัมพันธ์

Your doctor will examine your vagina and will take samples of the secretions with a swab to study with a microscope.



วินิจฉัย

แพทย์ทำการตรวจอุ้งเชิงกรานในส่วนของช่องคลอดและเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นแบคทีเรียชนิดใด

รักษา

ยาปฏิชีวนะ(metronidazole, clindamycin) มีทั้งยาทึบและยาเหน็บทางช่องคลอด ถ้าไม่รับ

รักษาอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่น อุ่มเชิงกรานอักเสบ เนื้อเยื่อมดลูกเจริญผิดที่ ปากมดลูกอักเสบ มีปัญหา หากต้องการตั้งครรภ์ ติดเชื้อหลังการผ่าตัดได้



Antibiotics (oral or vaginal cream) can kill the bacteria. Follow your doctor's instructions for how long

ควรไม่ควร

- ✓ ควรพบแพทย์ถ้าคุณรู้สึกว่ามีอาการของการติดเชื้อ
- ✓ ควรมาตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง
- ✓ ควรกินยาปฏิชีวนะตามแพทย์สั่งให้ครบถึงแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม
- ✓ ควรจะมีคู่นอนเพียงคนเดียวเพื่อป้องกันการติดเชื้อในอนาคต



- ⊘ ไม่ควร กินยาอื่นนอกจากยาที่แพทย์สั่งหรือรับยาจากผู้อื่นมากินต่อ
- ⊘ ไม่ควรสวนล้างช่องคลอดก่อนมาพบแพทย์เนื่องจากแพทย์ต้องเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งไปตรวจหาเชื้อและให้ยารักษาได้ตรงจุด