


เป็นการติดเชื้อไวรัสบนพืชหนังชั้นบนสุดและติดต่อ กันง่ายโดยเฉพาะในเด็กๆ และวัยรุ่น หากขึ้นที่ อวัยวะเพศ จะถูกเรียกว่าโคงติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เกิดจาก poxviruses เป็นไวรัสที่ติดต่อ กับ การ สัมผัสจากคน สู่ วีกคน หรือติดต่อ จากการ ใส่ เสื้อ บ า ของ คน ที่ มี เชื้ อ

១០១

คนที่ติดเชื้อไม่ทำการคัน กดเจ็บที่ หูดแต่งย่างให้ช้ำได้รับเชื้อบาแหลว 2-7 สัปดาห์แล้วตุ่มเกิดจะขึ้น ตุ่มจะขึ้นที่หน้า เปลือกตา ใต้วงศีบ ขาหนีบ โดยปกติตุ่มจะไม่ขึ้นที่ฟ่าเมือฟ่าเก้าและปาก ส่วนบนตรงกลางของตุ่มจะเป็นหนองช้ำเต็มไปด้วยเชื้อไวรัส สามารถหายเองได้ในหลายอาทิตย์ กัดนาฬิกาไม่ทั้งรอยแพลเป็นไว้




ວິນິຈອັຍ

ໃນຈាເປັນຕ້ອງໃຫ້ວິທະຍາວຈາເວພາະ ແພທຍົກເພີຍງແຕ່ດຸ
ລັກເຜົະຕຸ່ມບປພິວໜັງ ບາງກ້າວຈະເກີບຕົວຢ່າງໜບວງ
ໄປສ່ວງກລ້ວງດູເພື່ອປະກອບກາຮວບນິຈຈັຍ

รักษา

ตุ่มสามารถหายเองได้ แต่พิจารณาติดเชื้อต้องดูแลไม่ให้ไปติดผู้อื่นหรืออวัยวะส่วนอื่นๆ การรักษาอีบูช์บัน เลเซอร์ ฟลูซิ่ง หรือการขูดออก ซึ่งอาจจำเป็นหากเกิดแพลสีน และโรคนี้เป็นได้มากกว่าหนึ่งครั้งถ้าหากไปใช้สิ่งของร่วมหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้ออีก ดังนั้นควรอยู่ให้ห่างจากผู้ที่ได้รับเชื้อ



ควรไม่ควร

- ✓ ควรหลีกเลี่ยงการร่วมเพศกับบุคคลที่มีหูดขึ้นบนอวัยวะเพศ
- ✓ ควรรักษาความสะอาดตัวแห่นั่งที่มีหูดและพัาก็อตคลุมเพื่อลดการกระจายเชื้อ
- ✓ ควรพบแพทย์ทันทีถ้าหูดมีอาการแย่ลง



✗ ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นจนกว่าหูดจะหายดี

✗ ไม่ควรเกาที่หูดและไปจับส่วนอื่นของร่างกาย เพราะนอกจากจะกระจายเชื้อไปส่วนอื่นแล้วยังเพิ่มการติดเชื้อตัวแห่นั่งที่เป็นอักด้วย

✗ ไม่ควรไปว่ายน้ำในสระน้ำสาธารณะ ชาวด์หน้า และว่ายน้ำแบบน้ำ จนกว่าหูดจะหายเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น