



# ວິສຸກວິສ Chickenpox

ເປັນໂຮຄຕົດຕ່ວອກາງພິວຫັນແລະເນື້ອຍໜ່ວຍ ສ່ວນໃຫລູມັກເກີດໃນກຸລຸ່ມຄນອາຍຸນ້ອຍໆ ເຊັ່ນ ໃນວາຍຸເດືອກ 2-8 ປີ ດ້ວຍເກີດໃນພູ້ໃຫລູຈ່າກວ່າການຂອງໂຮຄຈະຮຸນແຮງກວ່າແລະຍາວບານກວ່າບຸຄຄລກ່າວ່າໄປສາມາຮັດ ສ້າງກຸມັກຸມັກນາມເພື່ອກຳດັບຈັດໄວຮສຕັວນີ້ເນື່ອມີການຕົດເຊື້ອໃນຄຣັງແຮກແລະເພື່ອໄປໃຫ້ຕົດເຊື້ອໜ້າ ສໍາຫຼັບບາງຄນໂຮຄວາຈະພັດນາກລາຍເປັນ ໂຮຄງສົວດ (herpes-zoster) ໂຮຄວິສຸກວິສສາມາຮັດເກີດຂັ້ນມາອັກໄດ້ດ້າກຸມັກຸມັກນວ່ອນແວລູນມີວັນຊັບ ກຸມັກຸມັກນສໍາຫຼັບປ້ອງກັນໂຮຄວິສແລະງູສົວດ



F. Netter

## ວາກາຣ

ຮະຢະເຊື້ອຂໍຍາຍຕົວໃນຊ່ວງ 7-21 ວັນ ມີກັບເລັງໄດ້ຮັບເຊື້ອ ພູ້ປ່ວຍຈະເຮີ່ມນີ້ໄຟຕໍ່າໆ ນ້ຳນຸກໄໝລ ມີວາກາຣໄວ ປັດຫົວວ່ອນເພີ້ຍ ອຍາກວາຫາຮລດລົງ ທີ່ຈຶ່ງຕຸ່ມແດງຈະຂັ້ນ ຕາມຮ່າງກາຍປະມານ 2-3 ວັນ ກັບຈົກລາຍເປັນພື້ນຕຸ່ມນ້ຳໃສ ຄັບ ແລະຈະແໜ້ງກລາຍເປັນສເກີດແພລ ໃນອັກ 4-5 ວັນ ດັ່ງນີ້ມີກັບມາ ບາງຄນກັ້ຕຸ່ມແດງຂັ້ນເລື້ອນບ້ອຍ ບາງຄນກີ່ຂັ້ນເປັນຈຳນວນນາກ ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງໄປ ໂຮຄວິສຸກວິສ ມີຮະຢະຕົດຕ່ວ 1-2 ວັນ ກ່ອນຈະມີຕຸ່ມນ້ຳໃສແດງລາມຂັ້ນເປັນເວລາ 6 ວັນ ພູ້ປ່ວຍຈະນີ້ຮອຍແພລຕານປາກ ຮູ໌ແລະ ຕາກັ້ງສອງຂ້າງ



## ສາເຫດ


ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຮສ vericella-zoster herpes ບຸຄຄລ ກ່ຽວໄປສາມາຮັດໄດ້ຮັບເຊື້ອໄດ້ຫາກນີ້ພູ້ປ່ວຍທີ່ຕົດເຊື້ອວູ້ໃກລ້າ ທີ່ຈຶ່ງເຊື້ອສາມາຮັດແພຣ່ກາງກາຍຫາຍໃຈ ໃນຂະນະເດືຍວັກນັກສາມາຮັດໄດ້ຮັບເຊື້ອຈາກພູ້ປ່ວຍໂດຍຕຽງຈາກການສັນພັສແພລຕານພິວຫັນ

## ວິນິຈັຍ

ແພຍງດູຈາກວາກາຣທີ່ແສດງແລະລັກຜະລະຂອງພື້ນທີ່ຂັ້ນຕາມຮ່າງກາຍ

## ຮັກເຫາ

ເດືອກທີ່ສຸກພາພດຕ່ວຍໆແລ້ວໄປຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກເຫາວ່າໄຣເປັນພິເສດເຊື່ງສາມາຮັດ ມາຍເອງໄດ້ ວາຈະໃຊ້ acetaminophen ເພື່ອລົດໄໝ ແລະ ລ້າມໃຫ້ແວສີພຣັບໂດຍເດືດຂາດ ຍາແກ້ແພ້ເຮົວຄາລານາຍດີ ຊ່ວຍລດວາກາຮັບຕັນ ແບະນຳກົນວາຫາຮວ່ອນບາມ ແລະພັກພ່ອບໃຫ້ເພີຍພວ ແລະເພື່ອປ້ອງກັນການແພຣ່ກະຈາຍເຊື້ອ ຄວຣແຍກພູ້ປ່ວຍຈົນກະຮັງແພລຕັກສເກີດ ກຸລຸ່ມຄນທີ່ເສີ່ງທີ່ຈະຕົດເຊື້ອຮຸນແຮງ ຄົວກຸລຸ່ມຄນທີ່ກຸມັກຸມັກຕໍ່າ (ພູ້ປ່ວຍທີ່ເຄຍປຸລູກດ່າຍໃກກະດູກ, ໂຮຄລູກີ່ເນີຍ) ວາຈະຕ້ອງກົນຍາເພື່ອປ້ອງກັຍກາວະແກຣກຂ່ອບຈາໂຮຄວິສຸກວິສ



## ควรและไม่ควรทำ

- ✓ ควรพบรแพกย์กันกีในขณะตั้งครรภ์และพบร่วมได้รับเชื้อ
- ✓ ควรล้างมือสม่ำเสมอ ซักผ้าปู สวมเสื้อผ้าที่ผ่านการอบความร้อน
- ✓ ตัดเล็บให้สั้นเพื่อป้องกันการเกาแพลและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ
- ✓ พักผ่อนให้เพียงพอ กำจัดธรรมไม่หนักมาก
- ✓ ควรใช้ยาลดไข้ที่ไม่ใช่แอลสไฟริน
- ✓ ควรแจ้งพยาบาลและผู้ปกครองของเด็กที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเพื่อให้ทราบว่ามีโอกาสติดเชื้อ



- ✓ ควรกินยาแก้แพ้ หรือใช้ฟองน้ำดูดตัว เพื่อลดอาการคัน
- ✓ ควรพบรแพกย์กันกีเมื่อยื้อสูง 10°F หรืออุ่นแรงปวดหัว ตอบสนองต่อแสงไวมากขึ้น
- ✓ ควรพบรแพกย์เมื่อมีอาการอาเจียน นอนไม่ได้ กระวนกระวายเกิดขึ้น และความรู้สึกตัวลดลง
- ✓ ควรรู้จักวัสดุที่ใช้ป้องกัน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นอีสุกอีใส

🚫 ไม่ควรแกะเกาแพล

🚫 ไม่ควรให้ผู้ป่วยอยู่ใกล้เด็กและสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือ คนที่ภูมิคุ้มกันต่ำ

🚫 ไม่ควรให้ผู้ป่วยไปโรงเรียน ลาหยุดอย่างน้อย 6 วันหลังจาก มีตุ่มน้ำสีแดงเกิดขึ้นจนกระถั่งแพลแห้งและตกสะกิด

🚫 ไม่ควรให้แอลสไฟรินกับเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี เพราะเพิ่ม ความเสี่ยงที่จะเกิดโรค Reye's syndrome

