



คือการติดเชื้อบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิง เชื้อแพร่กระจายทางปากมดลูกเข้าไปในมดลูก ท่อนำไข่ รังไข่ และทั่วบริเวณท้องน้อยและอู้งเชิงกราน การมีประจำเดือนยังกระจายเชื้อได้ง่าย หากวินิจฉัยและรักษาได้เร็วก็จะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน การเกิดการอักเสบและเป็นแผลเป็นบริเวณท่อนำไข่หรือรังไข่ ยังทำให้ตั้งครรภ์ได้ยากขึ้นและอาจเกิดการท้องนอกมดลูกได้



สาเหตุ

เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อหนองใน(gonorrhea หรือ



chlamydia) หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น โอกาสเกิดภาวะอู้งเชิงกรานอักเสบคือการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือมีคู่นอนหลายคนหรือใช้ห้วงคุมกำเนิด

อาการ

อาการส่วนใหญ่ปวดบริเวณอู้งเชิงกรานอาจจะมีไข้หรือไม่มี มีสารคัดหลั่งทางช่องคลอดมากขึ้น

วินิจฉัย

วินิจฉัยจากอาการและการตรวจร่างกาย ตรวจภายในช่องคลอดและการตรวจห้องปฏิบัติการ การตรวจเลือดช่วยบอกถึงการติดเชื้อ ผู้ที่อยู่ในวัยเริ่มเข้าสู่วัยทอง



ควรตรวจการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มทำการรักษา บางครั้งอาการท้องนอกมดลูกกับการอักเสบของอู้งเชิงกรานมาคล้ายคลึงกัน

การรักษา

รับรักษาให้เร็วก่อนเชื้อแพร่กระจายไปที่อื่น แพทย์จะให้ทั้งยาทางหลอดเลือดและยากับหรือ ฉพาะยาปฏิชีวนะแบบกิน

การติดเชื้ออย่างรุนแรงควรรักษาตัวที่รพ.และให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ ส่วนของถุงที่เกิเกิดขึ้นบริเวณท้องนำไขและรังไข่รักษาโดยวิธีทำ Laparoscopic



ควรไม่ควร

- ✓ ควรกินยาปฏิชีวนะตามที่แนะนำ
- ✓ ควรให้คู่นอนร่วมรักษาด้วย ลดการติดเชื้อ
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นหลังรักษาไป 48 ชม.เช่น มีไข้สูง หรือปวดอุ้งเชิงกรานมากขึ้น
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากคุณแพ้ยา

- ✗ ไม่ควรละเลยการป้องกันการใส่ถุงยาง
- ✗ ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์จนกว่าแพทย์แจ้งอาการดีขึ้น

