



เป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบในประเทศเขตร้อน  
ร้อน เป็นการติดเชื้อเรื้อรังบริเวณอวัยวะเพศและขาหนีบ  
เกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสองเท่า ในช่วงอายุ 20-40  
ปี



## สาเหตุ

จากการติดเชื้อแบคทีเรีย *Calymmatobacterium  
granulomatis*.

## อาการ

แสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อ 1-2 สัปดาห์ เป็นตุ่มนูนแดงอยู่  
บริเวณลำกล้อง แคมใหญ่ และช่องคลอด บางทีอยู่บริเวณขาหนีบ  
ไม่มีอาการเจ็บจนกระทั่งตุ่มโตขึ้นและแตกเป็นแผลทำให้บริเวณนี้  
เกิดอาการแฉะ ขอบนูนและกลายเป็นแผลเป็น



## วินิจฉัย

จากการซักประวัติตรวจร่างกาย และตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย  
บริเวณแผล โดยการขูดเก็บชิ้นเนื้อร่วมกับตรวจหา  
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


## การรักษา

ใช้ยาปฏิชีวนะเช่น doxycycline ciprofloxacin หรือ azithromycin กินยา  
ประมาณ 3 สัปดาห์จนกระทั่งหายดี บริเวณแผลแห้งมากขึ้น ควรดื่มเพศสัมพันธ์  
จนกว่าจะหายสนิท นัดติดตามอาการจนกว่าแผลจะ  
สรุปว่าไม่ต้องการรักษาต่อ



## ควรไม่ควร

- ✓ ควรกินยาปฏิชีวนะจนกระทั่งครบตามแพทย์สั่ง
- ✓ ควรรักษาแผลให้สะอาดและแห้งสนิท
- ✓ ควรไปตามนัดแพทย์จนกว่าแพทย์จะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องรักษาต่อ
- ✓ ควรบอกคุณนอที่ว่าการเพื่อที่คุณจะได้ตรวจและรักษาหากจำเป็น
- ✓ ควรตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ✓ ควรหลีกเลี่ยงมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
- ✓ ควรใส่ถุงยางอนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากแผลมีอาการเจ็บหรือมีสารคัดหลั่งมากขึ้น
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากมีไข้ระหว่างการรักษา
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากคุณกินยาปฏิชีวนะไม่ได้



- ✗ ไม่ควรข้ามหยุดยาจนกว่าครบคอร์สการรักษา
- ✗ ไม่ควรลืมนัดแพทย์หากรักษาไม่หายอาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้
- ✗ ไม่ควรทาครีมหรือโลชั่นลงบนแผลหากแพทย์ไม่ได้สั่ง
- ✗ ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์จนกว่าแพทย์จะแจ้งว่าแผลหายดี

