


ເປັນໂຣກຕິດຕໍ່ກາງເພສສົມພັນຮົກດີເປັນແຟລຄດເຈີບບຣີວລວວຍະເພສໂດຍເຈພາະບຣີວລພີ
ວຂອງວຍະເພສ ສາມາດຕິດຕໍ່ແຕ່ຮັກສາໄດ້

ສາເຫຼ

ເກີດຈາກເຂື່ອແບກຕີເຣີຍ *Haemophilus ducreyi*
ກໍາເິກເກີດແຟລຣີມ່ອນ ສາມາດຕິດຈາກໄດ້ໂດຍສົມພັນໂດຍຮງ



ອາການ

ອາການປຣາກູໃນ 4 ຕົ້ງ 7 ວັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເຂື່ອ
ເປັນພິວຍກສູງເຈັບແລະແດງຮອບໆແຟລ ສິ່ງແຕກເປັນແຟລ
ພູ່ຫລົງມັກຈະເກີດເປັນແຟລຮອບນອກຂ່ວງຫລອດ
ຕໍ່ອນນໍ້າເສື່ອບຣີວລຫົວຫນ້າວ ຮະຫວ່າງ
ແລະກ້ອນສ່ວນລ່າງອາຈະບວມໄດ້ ໄຂ້ ປວດຫົວ ຫນາວສິ້ນ ແລະອ່ອນແຮງ
ພູ່ຫລົງອາການອັກເສບມໍ່ຄ່ອຍເຫັນອາການຂອງການຕິດເຂື່ອຂັດ
ແຕ່ຈະມີອາການເຈັບກໍຕໍ່ເມື່ອປັສສາວະຫຼືມີເພສສົມພັນຮົ



ວິນິຈັຍ

ຈາກການຕຣວຈພົວຫນັງບຣີວລທີ່ມີແຟລແລະເກັບຕົວອ່ຍງຈກແຟລທີ່ຕິດເຂື່ອ
ແລະຕຣວຈເສືອດຈາກການຕິດຕໍ່ກາງເພສສົມພັນຮົອື່ນໆທີ່ອາຈາເກີດຂື້ນໄດ້
ແລະບຸກຄລທີ່ມີເພສສົມພັນຮົດ້ວຍຄວຣມາຕຣວຈາເຊ່ນກັນ



รักษา

แพทย์จะจ่ายยาปฏิชีวนะเช่น azithromycin ,ciprofloxacin หรือ erythromycin หรือเป็นยาฉีด ceftriaxone ร่วมกับยาแก้ปวด และฟอกแผล ด้วยสบู่และเช็ดให้แห้งสามครั้งต่อวัน มีควรรักษาครีมหรือโลชั่น บริเวณแผลยุงเพิ่มโอกาสการติดเชื้อเข้าแผล กิจกรรมร่วมเพศควรหลีกเลี่ยงไปก่อนจนกว่าจะหายดี ประมาณ2-3สัปดาห์



ควรไม่ควร

- ✓ ควรกินยาปฏิชีวนะจนกว่าจะหายดี
- ✓ ควรกินยาแก้ปวดเมื่อมีอาการปวด
- ✓ ควรฟอกแผลล้างและเช็ดทำความสะอาดสามครั้งต่อวัน
- ✓ ควรบอกคุณนอของท่านเกี่ยวกับการติดเชื้อเพื่อที่เขาจะได้รับการรักษาด้วย
- ✓ ควรการมีเพศสัมพันธ์ระหว่งที่ติดเชื้อจนกว่าแพทย์จะแจ้งว่าหายดี
- ✓ ควรรับแจ้งแพทย์หากยังมีไข้หลังกินยาปฏิชีวนะครบหมดแล้ว
- ✓ ควรรับแจ้งแพทย์หากมีแผลขึ้นที่อื่นหรือติดเชื้อ



- ✗ ไม่ควร กินเลยเวลาหรือหยุดยาเองเมื่อรู้สึกดีขึ้นแล้ว
- ✗ ไม่ควร ทาครีม ชื่นหรือน้ำมันใกล้แผล
- ✗ ไม่ควร มีเพศสัมพันธ์จนกว่าแพทย์จะแจ้งดีขึ้นแล้ว

