



เป็นมะเร็งเม็ดเลือดที่พบได้น้อย เป็นโรคของ B cells หรือ lymphocytes เป็นชนิดของเม็ดเลือดขาว มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดนี้พบบ่อยในชายกลางคนมากกว่าหญิง และเกิดขึ้นได้ 2% ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้งหมด



สาเหตุ

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน ไม่มีการพบเคมีหรือฉายแสงที่เกี่ยวข้องกับตัวโรค การมีวทกชั้นของดีเอ็นเอ ทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตมากขึ้น และไม่เป็นโรคติดต่อ และไม่ส่งผ่านพันธุกรรม

อาการ

เซลล์ที่ผิดปกติเข้าไปในม้ามและไขกระดูกซึ่งทำให้เกิดอาการ เช่นการโป่งตึงและไม่สบายท้องเนื่องจากการขยายของม้าม เม็ดเลือดแดงน้อย เหนื่อย หายใจสั้น เม็ดเลือดขาวต่ำยิ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่าย อาจพบ น้ำหนักลดผิดปกติร่วมตัว



วินิจฉัย

จากการซักประวัติตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ในเบื้องต้น การวินิจฉัยขั้นสุดท้ายคือการตรวจหาเซลล์เฉพาะ hairy white blood ในเลือด ทำโดยแพทยเฉพาะทางด้านโรคเลือดโดยการเจาะไขกระดูกมาส่งกล้องจุลทรรศน์

การรักษา

เนื่องจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์มี
ขนจะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นอย่างช้า ๆ การ
รักษาในทันทีทันใดนั้นอาจไม่จำเป็นจำนวน
เม็ดเลือดที่น้อยลง อาการก่อให้เกิดการ
ขยายขนาดของม้าม รักษาด้วยการทำคีโม



โดยใช้ยา cladribine (2-CDAs) และ 2 deoxycoformycin (DCF, pentostatin)
อาจมีผลข้างเคียง เช่น เม็ดเลือดลดลงชั่วคราว ซาปลายนิ้ว มือนิ้วเท้า หากทำคีโมไม่
สำเร็จ ยาจำพวก Interferon หรือ rituximab นำมาใช้ร่วมรักษาต่อไป

ควรไม่ควร

- ✓ ควรร่วมมือในการทำเคมีบำบัด
- ✓ ควรหลีกเลี่ยงการเล่นกีฬา แปรปรวนด้วยแปรปรวน
อ่อนๆ โคนด้วยมิดโคนไฟฟ้าหากมีเกล็ดเลือดต่ำ
- ✓ ควรแจ้งแพทย์หากมีเลือดออกกุดแล้วไม่หยุดไหล
มากกว่า 5 นาทีหรือใช้
- ✓ ควรศึกษาเกี่ยวกับอาการป่วยของตัวเอง



✗ ไม่ควรกินอาหารที่ไม่ปรุงสุก
หากมีเม็ดเลือดขาวต่ำ

