




โรคตับอักเสบจากการดื่มสุรา




เป็นโรคที่ตับอักเสบบวมและระคายเคือง
สามารถรักษาได้แต่ต้องหยุดกินเหล้า

หากยังกินต่อตับจะเยื่องกล้ายเป็นโรคตับแข็งและก่อให้เกิดมะเร็งตับต่อมา โรคตับแข็งไม่สามารถรักษาได้ซึ่งเกิดจากการที่เนื้อยื่องตับถูกทำลายและถูกแทนที่ด้วยรอยแพลเป็นสิ่งพลิกหัวตับทำงานเยื่องและหยุดทำงาน โรคนี้เกิดในคนอายุมากกว่า 30 ปี

สาเหตุ

เกิดจากการกินเหล้าปริมาณมากและนานหลายปี



อาการ

จะไม่มีอาการแสดงออกมานานกว่าตับจะพัง
ลักษณะอาการเหมือนการที่ตับติดเชื้อไวรัส
อาการช่วงแรกจะมีพัฒนาขึ้น ปวดตามข้อ
อาการคล้ายเหมือนไข้หวัด
โดยปกติพบที่ดื่มเหล้ามากจะขาดสารอาหาร
ในขณะที่โรคนี้กำลังเยื่องจะมีอาการพิวเหลือง ตาเหลือง อุจจาระสีเหลือง
คันที่ว่า อุณหภูมิร่างกายสูง ท้องบีบบี้มาสะสมทำให้ขยายขนาดขึ้น จะรู้สึกปวด
เจ็บบริเวณตับ อาการสับสน และทำให้昏迷ได้




วิบัติ

แพทย์วิบัติจากประวัติการดื่มแอลกอฮอล์



การตรวจเลือดที่บ่งบอกว่าตับมีการอักเสบ และการตรวจท้องที่บ่งบอกว่าตับโต หากต้องการคุณเฟร์รีมการวินิจฉัยโดยการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ
ซึ่งการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจโดยการใช้เข็มเจาะผ่านพิวหนังเพื่อตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ



การรักษา

รักษาตามอาการ เป้าหมายคือ
การดูแลร่างกายให้ผู้ป่วยแข็งแรงมากขึ้น
ที่สำคัญคือการหยุดดื่มเหล้า

ผู้ป่วยอาจจะเข้าสูบยับบัดเพื่อเลิกเหล้า ส่วนภาวะขาดสารอาหาร
เมียงให้กินอาหารที่มีประโยชน์ หนึ่งในนั้นต้องมีแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตที่สูง
หรือผู้ที่ขาดมากจำเป็นต้องให้สารอาหารทางหลอดเลือด
กินอาหารที่มีชาเดย์เมนอยช่วยป้องกันการขยายขนาดของท้องได้ส่วนหนึ่ง
วิตามินเสริมยังจำเป็นต่อร่างกาย เช่น วิตามินบี โฟลิก
จะช่วยให้ตับค่อยๆดีขึ้นอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นปี

ควรไม่ควร

- ✓ ควรหยุดดื่มเหล้า
- ✓ ควรกินอาหารให้สมดุล แคลอรี่สูง
- ✓ ควรได้รับวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินบี โฟลิก
- ✓ ควรเปลี่ยนกิจกรรมประจำวัน รุ้วจกออกกำลังกายมากขึ้น
- ✓ ควรรับประทานยาที่มีอาการที่แสดงถึงโรคตับอักเสบ
- ✓ ควรรับประทานยาที่มีอาการหลังจากดื่มเหล้านานๆ



- ✗ ไม่ควรกินเหล้า เสี่ยงต่อการตับแข็งได้
- ✗ ไม่ควรกินอาหารชาเดย์เมนสูง ยิ่งทำให้ท้องโตมากขึ้น
- ✗ ไม่ควรใช้ยาที่มีผลต่อตับ เช่น พาราเซตามอล